

استفاده از موجک هار برای بسط سری انتگرال‌های وینر کسری

فرشید میرزائی، افسون حمزه

دانشگاه ملایر، دانشکده علوم ریاضی و آمار، گروه ریاضی

دریافت ۹۶/۰۶/۱۳ پذیرش ۹۶/۱۰/۱۷

چکیده

در این مقاله، ضمن بیان ویژگی‌هایی از توابع موجک هار، به ارائه روشی برای تقریب جواب انتگرال وینر کسری با پارامتر هرست $(\frac{1}{2}, 1) \in H$ با استفاده از این توابع می‌پردازیم. هم‌چنین تجزیه و تحلیل خطای روش مورد نظر ارائه شده است. این روش را روی چند مثال پیاده سازی کرده و نتایج عددی را در قالب جدول مقادیر خطای ارائه می‌دهیم. دقت مطلوبی از نتایج در مورد تعداد کمی از نقاط در مثال‌های ارائه شده مشاهده می‌شود.

واژه‌های کلیدی: توابع موجک هار، انتگرال‌های وینر کسری، حرکت براونی.

رده بندی ریاضی: ۴۵E۱۰، ۴۵B۲۵، ۴۵A۳۳.

مقدمه

حسابان تصادفی در بررسی معادله‌های انتگرال تصادفی و دیفرانسیل تصادفی نقشی برجسته ایفا می‌کند. هم‌چنین، حرکت براونی کسری در بسیاری از زمینه‌های علوم ریاضی و مهندسی، از جمله فیزیک، اقتصاد، زیست‌شناسی کاربرد زیادی دارند. یافتن روش‌های دقیق و کارآمد برای حل معادلات دیفرانسیل تصادفی و انتگرال تصادفی حائز اهمیت است. از آن‌جاکه جواب‌های دقیق اکثر این معادلات در دسترس نیست یا پیدا کردن جواب دقیق آن‌ها فرایند بسیار مشکلی است، روش‌های تقریبی و عددی به طور گسترده استفاده می‌شود. از جمله روش‌های عددی برای حل این معادلات، فرم‌های دیریکله، تقریب اویلر، محاسبات مالیاوین، انتگرال اسکروهد و تکنیک‌های مسیری و مرتبط [۱]-[۵]. هم‌چنین، در چند مقاله دیگر حل معادلات تصادفی بررسی شده است [۶]-[۱۷].

در این کار، با استفاده از بسط سری توابع موجک هار، انتگرال وینر کسری به صورت (۱)

$$\int_a^b f(t) dB^H(t), \quad t \in [0, T], \quad (1)$$

را تقریب می‌زنیم، به طوری که تابع f ، تابعی معلوم و B^H حرکتی براونی کسری است که با توجه به این که $B(t)$ برای $t \geq 0$ یک حرکت براونی استاندارد است، می‌توان آن را بدین صورت نمایش داد [۱۸]:

$$B^H(t) = \frac{1}{\Gamma(H + \frac{1}{2})} (Z(t) + \int_0^t (t-s)^{H-\frac{1}{2}} dB(s)),$$

به طوری که Z یک فرایند تصادفی و $(\int_0^t (t-s)^{H-\frac{1}{2}} dB(s))$ یک طرح براونی کسری لیوویل است. بهوضوح اگر

باشد، حرکت براونی کسری تبدیل به حرکت براونی خواهد شد.

اگر $H \in (0,1)$ ، می‌توان فرایند تصادفی گاووس را بدین صورت بیان کرد:

$$E(B^H(t)) = 0, \quad \text{cov}(B^H(s), B^H(t)) = \frac{1}{2} s^{2H} + t^{2H} - (t-s)^{2H}.$$

این فرایند طرح برونین کسری با پارامتر هرست نامیده می‌شود که در [۱۹] و [۲۰] مطرح شده است. برای ساده‌سازی قرار می‌دهیم. برای جزئیات بیشتر [۲۱] را ببینید.

موجک‌هار و خواص آن

خانواده متعامد موجک‌هار، $(h_n(t))$ ، روی بازه $(0,1)$ بدین صورت تعریف می‌شود [۲۲، ۲۳]:

$$h_n(t) = 2^{\frac{j}{2}} \psi(2^j t - i), \quad j \in \mathbb{N}, \quad i \in \mathbb{Z},$$

به طوری که

$$h_0(t) = 1, \quad 0 \leq t < 1,$$

و

$$h_n(t) = \begin{cases} 2^{\frac{j}{2}} & \alpha \leq t < \beta, \\ & 0 \leq t < 1, \quad n = 1, 2, \dots, \\ -2^{\frac{j}{2}} & \beta \leq t < \gamma, \end{cases}$$

$$\alpha = \frac{k}{m}, \quad \beta = \frac{(k+0.5)}{m}, \quad \gamma = \frac{(k+1)}{m};$$

$$m = 2^l, \quad l = 0, 1, \dots, \quad k = 0, 1, \dots, m-1.$$

به طوری که l یک عدد صحیح است و h_n ‌ها در خارج از بازه $(0,1)$ صفرند.

تابع دلخواه $f(t)$ روی بازه $(0,1)$ را می‌توان بدین صورت تقریب زد:

$$f(t) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i h_i(t),$$

به طوری که a_i ‌ها بدین صورت محاسبه می‌شوند:

$$a_i = \int_0^1 f(t) h_i(t) dt.$$


L را حداکثر مقدار از عدد صحیح l در نظر می گیریم و $M = 2^L$ قرار می دهیم. تابع دلخواه $f(t)$ را می توان با استفاده از توابع موجک هار به صورت مجموع متناهی (۲) تقریب زد:

$$f(t) \approx \sum_{i=0}^{M-1} a_i h_i(t), \quad i = 2^j + k, i \neq 0, \quad l = 0, 1, \dots, L-1. \quad (2)$$

همچنین، توابع موجک هار متعامد نرمال هستند:

$$\int_0^1 h_i(y) h_j(y) dy = \begin{cases} 1 & i = j, \\ 0 & i \neq j. \end{cases}$$

در شکل ۱، نموداری از موجک هار برای $L = 2$ نشان داده شده است.



شکل ۱. توابع موجک هار برای $L = 2$

تقریب انتگرال وینر کسری با استفاده از موجک هار

برای تقریب انتگرال وینر کسری در بازه $(0, 1)$ با استفاده از موجک هار با توجه به رابطه (۲) داریم:

$$\int_0^1 f(t) dB^H(t) \approx \sum_{i=0}^{M-1} f_i h_i(t) dB^H(t)$$

$$= \sum_{i=0}^{M-1} f_i \int_0^1 h_i(t) dB^H(t) = \sum_{i=0}^{M-1} \left(\int_0^1 f(t) h_i(t) dt \right) \left(\int_0^1 h_i(t) dB^H(t) \right),$$

و چون $(h_i(t))$ توابعی اسکالر هستند، داریم:

$$\int_0^1 f(t) dB^H(t) = \sum_{i=0}^{M-1} h_i^2(t) \left(\int_0^1 f(t) dt \right) \left(\int_0^1 dB^H(t) \right).$$

همگرایی و آنالیز خطای

در این بخش، روش ارائه شده بررسی می‌شود. فرض کنید که سری قطع شده توابع موجک هار، یک جواب تقریبی برای معادله (۱) باشد.

قضیه ۱. فرض کنید تابع f ، تابعی انتگرال پذیر مربعی در بازه $t \in D = [0,1]$ باشد و $f_m(t) = \sum_{i=0}^{M-1} f_i h_i(t)$

بسط تابع f با استفاده از توابع موجک هار باشد. همچنین فرض کنید که $e = f - f_m$ در این صورت اگر $|f'(t)| \leq L$

$$\|e\| \leq \frac{L}{\sqrt{3M}}.$$

قضیه ۲. خطای تقریب عددی انتگرال وینر کسری با استفاده از توابع موجک هار را،

$$e_m = \int_0^1 (f(t) - f_m(t)) dB^H(t)$$

قرار می‌دهیم. آنگاه داریم:

$$\|e_m\| \leq \frac{L}{\sqrt{3M}}$$

اثبات: با استفاده از $\|x\|^2 = E(x^2)$ داریم:

$$\left\| \int_0^1 (f(t) - f_m(t)) dB^H(t) \right\|^2 = E \left(\int_0^1 (f(t) - f_m(t)) dB^H(t) \right)^2.$$

همچنین، در [۲۱] مطرح شده است که اگر $H \in (\frac{1}{2}, 1)$ و $f(t) \in V[a, b]$ آنگاه داریم:

$$E \left(\int_a^b f(t) dB^H(t) \right)^2 = H(2H-1) \int_a^b \int_a^z f^2(t) (z-t)^{2H-2} dt dz. \quad (3)$$

بنابراین با استفاده از رابطه (۳) داریم:

$$\begin{aligned} E \left(\int_0^1 (f(t) - f_m(t)) dB^H(t) \right)^2 &= H(2H-1) \int_0^1 \int_0^z (f(t) - f_m(t))^2 (z-t)^{2H-2} dt dz \\ &= H(2H-1) \int_0^1 \int_0^1 (f(t) - f_m(t))^2 (z-t)^{2H-2} dz dt = H \int_0^1 (f(t) - f_m(t))^2 (1-t)^{2H-1} dt. \end{aligned}$$

حال با توجه به این که $H \in (\frac{1}{2}, 1)$ و $0 < t < 1$ ، می‌نویسیم:

$$\left\| \int_0^1 (f(t) - f_m(t)) dB^H(t) \right\|^2 \leq \int_0^1 (f(t) - f_m(t))^2 dt.$$

سپس با توجه به قضیه ۱، داریم:

$$\left\| \int_0^1 (f(t) - f_m(t)) dB^H(t) \right\| \leq \int_0^1 \|f(t) - f_m(t)\| dt \leq \frac{L}{\sqrt{3M}}$$

بنابراین، اثبات قضیه تکمیل شد.

مثال های عددی

در این بخش بهمنظور بیان کارایی روش موجک هار، دو مثال می آوریم. نتایج عددی با نرم افزار متلب به دست آمده است.

مثال ۱: انتگرال وینر کسری (۴) را در نظر بگیرید:

$$\int_0^1 \sin(t^2) dB^H(t), \quad (4)$$

که جواب دقیق آن معلوم نیست. می توان مقدار انتگرال فوق را بدین صورت محاسبه کرد:

$$\int_0^1 \sin(t^2) dB^H(t) = \sin(1) B^H(1) - \int_0^1 2t \cos(t^2) B^H(t) dt,$$

که $\int_0^1 2t \cos(t^2) B^H(t) dt$ را با استفاده از روش ذوزنقه ای حساب می کنیم. از طرف دیگر با استفاده از روش ارائه شده در این مقاله مقدار (۴) را محاسبه می کنیم. به طوری که جدول های ۱ و ۲ میانگین خطای (\bar{X}_E) و انحراف معیار (S_E) را برای مقادیر متفاوت H با 200 تکرار نشان داده شده است.

جدول ۱. میانگین (\bar{X}_E) ، انحراف معیار (S_E) و فاصله اطمینان برای میانگین با پارامتر $H = 0/5$ برای مثال ۱

فاصله اطمینان ۹۵٪ برای میانگین خطای				
L	\bar{X}_E	S_E	کران پایین	کران بالا
۲	۰/۰۰۳۲۵	۰/۰۰۱۵۲۰	۰/۰۰۳۰	۰/۰۰۳۵
۴	۰/۰۰۱۰۵	۰/۰۰۰۸۳۴	۰/۰۰۰۹۳	۰/۰۰۱۲
۸	۰/۰۰۰۵۲۶	۰/۰۰۰۴۱۳	۰/۰۰۰۴۶	۰/۰۰۰۵۸
۱۶	۰/۰۰۰۴۰۲	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۳	۰/۰۰۰۴

جدول ۲. میانگین (\bar{X}_E) ، انحراف معیار (S_E) و فاصله اطمینان برای میانگین با پارامتر $H = 0/8$ برای مثال ۱

فاصله اطمینان ۹۵٪ برای میانگین خطای				
L	\bar{X}_E	S_E	کران پایین	کران بالا
۲	۰/۰۰۰۵۱۸	۰/۰۰۰۳۲۸	۰/۰۰۰۴۷۲	۰/۰۰۰۵۶۳
۴	۰/۰۰۰۳۱۴	۰/۰۰۰۲۰۴	۰/۰۰۰۲۸۵	۰/۰۰۰۳۴۲
۸	۰/۰۰۰۰۳۵	۰/۰۰۰۰۱۶۲	۰/۰۰۰۰۳۲۷	۰/۰۰۰۰۳۷۲
۱۶	۰/۰۰۰۰۱۲	۰/۰۰۰۰۰۷	۰/۰۰۰۰۱۱۰	۰/۰۰۰۰۱۲۹

مثال ۲: انتگرال وینر کسری زیر را در نظر بگیرید:

$$\int_0^1 e^{t^2} dB^H(t), \quad (5)$$

که جواب دقیق آن معلوم نیست. می‌توان مقدار انتگرال فوق را بدین صورت محاسبه کرد:

$$\int_0^1 e^{t^2} dB^H(t) = eB^H(1) - \int_0^1 2te^{t^2} B^H(t) dt,$$

که $\int_0^1 2te^{t^2} B^H(t) dt$ را با استفاده از روش ذوزنقه‌ای حساب می‌کنیم. از طرف دیگر با استفاده از روش ارائه شده در

این مقاله مقدار (۵) را محاسبه می‌کنیم. به طوری که جدول‌های (۳) و (۴) میانگین خطای (\bar{X}_E) و انحراف معیار (S_E) را برای مقادیر متفاوت H با ۲۰۰ تکرار نشان داده شده است.

جدول ۳. میانگین (\bar{X}_E) ، انحراف معیار (S_E) و فاصله اطمینان برای میانگین با پارامتر $H = 0/5$ برای مثال ۲

فاصله اطمینان ۹۵٪ برای میانگین خطای				
L	\bar{X}_E	S_E	کران پایین	کران بالا
۲	۰/۰۰۰۶۲۵	۰/۰۰۰۵۱۳	۰/۰۰۰۵۵۳	۰/۰۰۰۶۹۶
۴	۰/۰۰۰۱۱۹	۰/۰۰۰۷۴	۰/۰۰۰۱۰۸	۰/۰۰۰۱۲۹
۸	۰/۰۰۰۰۸۱	۰/۰۰۰۶۰	۰/۰۰۰۰۲۱۵	۰/۰۰۰۰۱۶۴
۱۶	۰/۰۰۰۰۴۴	۰/۰۰۰۰۳۶	۰/۰۰۰۰۳۹	۰/۰۰۰۰۴۸۹

جدول ۴. میانگین (\bar{X}_E) ، انحراف معیار (S_E) و فاصله اطمینان برای میانگین با پارامتر $H = 0/8$ برای مثال ۲

فاصله اطمینان ۹۵٪ برای میانگین خطای				
L	\bar{X}_E	S_E	کران پایین	کران بالا
۲	۰/۰۰۰۱۴۲۵	۰/۰۰۰۶۱۸	۰/۰۰۰۱۳۳	۰/۰۰۰۱۵۱
۴	۰/۰۰۰۲۰۵	۰/۰۰۰۱۵۲	۰/۰۰۰۱۸۳	۰/۰۰۰۲۲۶
۸	۰/۰۰۰۰۶۱	۰/۰۰۰۰۴۳	۰/۰۰۰۰۵۵	۰/۰۰۰۰۶۶۹
۱۶	۰/۰۰۰۰۵۲	۰/۰۰۰۰۳۶	۰/۰۰۰۰۴۷	۰/۰۰۰۰۵۶۹

نتیجه‌گیری

در این مقاله، با استفاده از توابع موجک هار که ساده‌ترین موجک ممکن است، جواب تقریبی برای انتگرال‌های وینر کسری که بعضی موقع غیرممکن است که بتوان جواب دقیق برای آن‌ها یافت، به دست می‌آوریم. همچنین، تحلیل خطای روش مطرح شده ارائه شده است. مهم‌ترین مزیت این روش کم بودن هزینه راهاندازی دستگاه، بدون استفاده از روش‌های طرح‌ریزی است، بنابراین هزینه محاسباتی روش کم است و این مزیت، این روش محاسباتی را بسیار جذاب، ساده و مقومن به صرفه می‌کند. علاوه بر این، دقت روش با دو مثال نشان داده شده است.

تقدیر و تشکر

از داوران محترم به خاطر پیشنهادهای سازنده شان که موجب بهبود کیفیت و پربارتر شدن مقاله شد،
 کمال تشکر قدردانی را داریم.

منابع

1. Bertoin J., "Sur une intégrale pour les processus à α -variation borne", *The Annals of Probability*, 17(4) (1989) 1521-1535.
2. Guerra J., Nualart D., "Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion and standard Brownian motion", *Stochastic Analysis and Applications*, 26(5) (2008) 1053-1075.
3. Lisei H., Soós A., "Approximation of stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion", *Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications*, 59, (2008) 227-241.
4. Mishura Y., Shevchenko G., "The rate of convergence for Euler approximations of solutions of stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion", *Stochastic*, 80(5) (2008) 489-511.
5. Russo F., Vallois P., "Forward, backward and symmetric stochastic integration", *Probability Theory and Related Fields*, 97 (1993) 403-421.
6. Cortes J., Joda L., Villafuerte L., "Mean square numerical solution of random differential equations: facts and possibilities", *Computers and Mathematics with Applications*, 53, (2007) 1098-1106.
7. Cortes J. C., Joda L., Villafuerte L., "Numerical solution of random differential equations: A mean square approach", *Mathematical and Computer Modelling*, 45 (2007) 757-765.
8. Jankovic S., Ilic D., "One linear analytic approximation for stochastic integro-differential equations", *Acta Mathematica Scientia*, 30 (2010) 1073-1085.
9. Khodabin M., Maleknejad K., Rostami M., Nouri M., "Numerical solution of stochastic differential equations by second order Runge-Kutta methods(2011)", *Mathematical and Computer Modelling*, 53 (2011) 1910-1920.
10. Kloeden P. E., Platen E., "Numerical solution of stochastic differential equations", Berlin, *Applications of Mathematics*, Springer-Verlag (1999).
11. Murge M., Pachpatte B., "Successive approximations for solutions of second order stochastic integro-differential equations of Itô type", *Indian Journal of Pure and Applied Mathematics*, 21(3) (1990) 260-274.
12. Saito Y., Mitsui T., "Simulation of stochastic differential equations", *Annals of the Institute of Statistical Mathematics*, 45 (1993) 419-432.
13. Heydari M. H., Hooshmandasl M. R., Maalek Ghaini F. M., Cattani C., "A computational method for solving stochastic Itô-Volterra integral equations based on stochastic operational matrix for generalized hat basis functions", *Journal of Computational Physics*, 270 (2014) 402-415.

14. Zeng C., Yang Q., Chen Y. Q., "Lyapunov techniques for stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion", Hindawi Publishing Corporation Abstract and Applied Analysis (2014).
15. Guerra J., Nualart D., "Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion and standard Brownian motion, Stochastic Analysis and Applications (2008) 26.
16. Dai W., Heyde C. C., "Itô formula with respect to fractional Brownian motion and its application, Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis, 9 (1996) 439-448.
17. Lin S. J., "Stochastic analysis of fractional Brownian motions", Stochastics Stochastics, 55, (1995) 121-140.
18. Dung N. T., "Fractional stochastic differential equations with applications to finance", Journal of Mathematical Analysis and Applications, 397 (2013) 334-348.
19. Kolmogorov A. N., "Wienersche Spiralen und einige andere interessante Kurven im Hilbertschen Raum", Comptes Rendus (Doklady) de l'Academie des Sciences de l'URSS, 26, (1940) 115-118.
20. Mandelbrot B. B., Van Ness J. W., "Fractional Brownian motions, fractional noises and applications", SIAM Review, 10(4) (1968) 422-437.
21. Biagini F., Hu Y., Øksendal B., Zhang T., "Stochastic calculus for fractional Brownian motion and applications, London, Springer (2008).
22. Strang G., "Wavelets and dilation equations", SIAM, 31 (1989) 614-627.
23. Lepik U., "Numerical solution of differential equations using Haar wavelets", Mathematics and Computers in Simulation, 68 (2005) 127-143.
24. Mohammadi F., "Haar wavelets approach for solving multidimensional stochastic Itô-Volterra integral equations", Applied Mathematics E-Notes, 15 (2015) 80-96.