

تخمین دقیق ضرایب لگاریتمی رده‌های خاص از توابع تحلیلی

رحیم کارگر

سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، تهران

علی عبادیان

دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه ریاضی

نادر کنزي*

سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، تهران

دریافت ۹۶/۱۲/۱۳

پذیرش ۹۷/۱۲/۱۱

چکیده

فرض کنید A رده همه توابع تحلیلی و نرمال شده در قرص واحد باشد. برای هر تابع f از خانواده A ضرایب لگاریتمی

به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\log\left(\frac{f(z)}{z}\right) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \gamma_n z^n$$

فرض کنید زیررده S_A^* از A بدین صورت تعریف شود:

$$S_A^* := \left\{ f \in A : \left(\frac{zf'(z)}{f(z)} - 1 \right) < \sin z \right\}$$

که در آن " \Rightarrow " رابطه تبعیت است. هدف ما در این مقاله تخمین دقیق نامساوی‌ها شامل ضرایب لگاریتمی برای توابعی

است که به رده S_A^* تعلق دارند.

واژه‌های کلیدی: تابع تکارز، ستاره‌واری، تبعیت، ضرایب لگاریتمی، ضرب پیچشی

مقدمه

فرض کنید Δ قرص واحد در صفحه مختلط \mathbb{C} باشد، یعنی:

$$\Delta := \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}.$$

مجموعه همه توابع تحلیلی در قرص واحد را با H نشان می‌دهیم. همچنین A را زیردهایی از H در نظر می‌گیریم که اعضای آن در شرایط نرمال شده $1 - f(0) = 0 = f'(0)$ صدق می‌کنند و به صورت (۱) است:

$$(1) \quad f(z) = z + \sum_{n=2}^{\infty} a_n z^n.$$

فرض کنید تابع f به صورت (۱) باشد و تابع g بدین صورت تعریف شده باشد:

$$g(z) = z + \sum_{n=2}^{\infty} b_n z^n.$$

آن‌گاه ضرب پیچشی یا ادامارد^۱ دو تابع f و g بدین صورت تعریف می‌شود.

*نویسنده مسئول n.kanzi@pnu.ac.ir

$$(f * g)(z) := z + \sum_{n=2}^{\infty} a_n b_n z^n.$$

می‌گوییم تابع f در قرص واحد تکارز^۱ است هرگاه برای هر z_1 و z_2 متعلق به قرص واحد از $z_1 \neq z_2$ نتیجه شود $f(z_1) \neq f(z_2)$, در واقع f یک به یک باشد. مجموعه همه توابع تکارز در قرص واحد را با U نشان می‌دهیم. فرض کنید Ω یک ناحیه در صفحه مختلط باشد. می‌گوییم Ω نسبت به نقطه w_0 ستاره‌وار است هرگاه برای هر $w \in \Omega$ خطی که w را به w_0 وصل می‌کند کاملاً در Ω واقع شود. بنابراین f ستاره‌وار است هرگاه برد آن یک ناحیه ستاره‌وار باشد. مجموعه همه توابع ستاره‌وار در قرص واحد را با S^* نشان می‌دهیم. با به کارگیری قضیه معروف الکساندر^۲, f را در قرص واحد Δ محدب گوییم هرگاه $(zf'(z))'$ ستاره‌وار باشد. به صورت تحلیلی تابع ستاره‌وار و محدب بدین صورت تعریف می‌شوند:

$$f \in S^* \Leftrightarrow \operatorname{Re} \left(\frac{zf'(z)}{f(z)} \right) > 0 \quad (z \in \Delta)$$

۶

$$f \in K \Leftrightarrow \operatorname{Re} \left(1 + \frac{zf''(z)}{f'(z)} \right) > 0 \quad (z \in \Delta)$$

رده دیگری از توابع تحلیلی که مایل به یادآوری آن هستیم، رده توابع نزدیک به محدب نام دارد. گوییم تابع $f \in A$ نزدیک به محدب است، هرگاه یک تابع محدب مانند g موجود باشد به طوری که

$$\operatorname{Re} \left(\frac{f'(z)}{g'(z)} \right) > 0 \quad (z \in \Delta)$$

این رده از توابع را کاپلان^۳ [۵] در سال ۱۹۵۲ معرفی کرد که معمولاً آن را با نماد C نشان می‌دهند. برای رده‌های معرفی شده بالا روابط شمول زیر برقرارند:

$$K \subset S^* \subset C \subset U \subset A \subset H$$

برای جزئیات بیشتر می‌توان به کتاب معروف دیورن، [۲] مراجعه کرد.

فرض کنید f و g دو تابع تحلیلی در قرص واحد باشند. می‌گوییم تابع f از تابع g تبعیت می‌کند و می‌نویسیم $f \prec g$ تابعی تحلیلی مانند ω با شرایط:

$$\omega(0) = 0 \quad \text{و} \quad |\omega(z)| < 1 \quad (z \in \Delta)$$

موجود باشد به طوری که برای هر $z \in \Delta$ این رابطه برقرار باشد:

$$f(z) = g(\omega(z)).$$

در حالت خاص اگر تابع g تکارز باشد رابطه دو طرفه زیر را داریم:

$$f(z) \prec g(z) \Leftrightarrow (f(0) = g(0) \quad \text{و} \quad f(\Delta) \subset g(\Delta))$$

با استفاده از تعریف تبعیت و از این‌که تابع

$$h(z) = \frac{1+z}{1-z}$$

در قرص واحد تکارز است و همچنین

1. Univalent
 2. Alexander
 3. Kaplan

$$h(\Delta) = \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}\{w\} > 0\}$$

از این‌رو، تعریف‌های معادل زیر را برای توابع ستاوهوار و محدب داریم:

$$f \in S^* \Leftrightarrow \frac{zf'(z)}{f(z)} < \frac{1+z}{1-z} \quad (z \in \Delta)$$

۶

$$f \in K \Leftrightarrow 1 + \frac{zf''(z)}{f'(z)} < \frac{1+z}{1-z} \quad (z \in \Delta)$$


اولین بار تعریف رده توابع تحلیلی با استفاده از مفهوم تبعیت را ما^۱ و میندا^۲ معرفی کرد. اخیراً نیز پژوهش‌گران زیادی، رده‌های خاص و جالبی از توابع تحلیلی را با استفاده از مفهوم تبعیت معرفی کرده‌اند. برای مثال می‌توان به [۶]، [۷]، [۸]، [۹] مراجعه کرد.

هدف ما نیز در این مقاله معرفی یک زیررده خاص از توابع تحلیلی است که در ارتباط با ستاره‌واری و تابع $\sin z$ است که در زیر به آن اشاره می‌کنیم.

تعریف ۱. می‌گوییم تابع $f \in A$ به رده S_s^* تعلق دارد هرگاه در این رابطه تبعیت صدق کند:

$$\left(\frac{zf'(z)}{f(z)} - 1 \right) < \sin z \quad (z \in \Delta)$$

ویژگی‌های هندسی $\sin z$ می‌تواند نتایج جالبی را به ما بدهد. برای مثال برای هر $z \in \Delta$ این تابع کران‌دار و نسبت به مبدأ مختصات ستاره‌وار است. برای درک بیشتر می‌توان به برد این تابع (شکل ۱) توجه کرد.



شکل ۱. تصویر قرص واحد تحت تابع $\sin z$

از این‌رو، با توجه به این‌که تابع $\sin z$ در قرص واحد تکارز است و مقدار $\sin z$ و $1 - \frac{zf'(z)}{f(z)}$ در صفر برابر صفر است، از این‌رو، اگر $f \in S_s^*$ ، آن‌گاه $1 - \frac{zf'(z)}{f(z)}$ در ناحیه شکل ۱ قرار می‌گیرد. همچنین داریم:

¹ Ma
² Minda

$$\sin z = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n z^n$$

که در آن

$$\alpha_1 = 1 \text{ و } \alpha_3 = -\frac{1}{3!} \text{ و } \alpha_5 = \frac{1}{5!} \text{ ...}$$

و

$$\alpha_{2n} = 0.$$

انگیزه اصلی ما در این مقاله بررسی ضرایب لگاریتمی اعضای S_s^* است و عمدۀ دلیل آن نیز اهمیت ضرایب لگاریتمی در نظریه توابع هندسی است. لازم به ذکر است که دوبرانژ^۱ در سال ۱۹۸۵ با استفاده از مفهوم ضرایب لگاریتمی توانست حدس معروف بیبرباخ^۲ را ثابت کند [۱]. ضروری است در ادامه به توضیح مختصری از ضرایب لگاریتمی بپردازیم.

برای هر $f \in A$, ضرایب لگاریتمی $\gamma_n := \gamma_n(f)$ بدین صورت تعریف می‌شوند:

$$\log\left(\frac{f(z)}{z}\right) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \gamma_n z^n \quad (z \in \Delta)$$

به دست آوردن ضرایب لگاریتمی یک تابع در حالت کلی کاری نسبتاً آسان است. به عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین توابع در نظریه توابع هندسی تابع معروف کوبه^۳ است که بدین صورت تعریف شده است.

$$k(z) = \frac{z}{(1-z)^2} = z + 2z^2 + 3z^3 + \dots + nz^n + \dots$$

این تابع برای خیلی از مسائل یک تابع اکسترمال است که مهم‌ترین آن‌ها در حدس بیبرباخ است. این حدس بیان می‌کند برای هر تابع $f \in U$ ضرایب آن در نامساوی $n \leq |a_n|$ صدق می‌کنند و تساوی برای ضرایب تابع کوبه برقرار است. از این‌رو، داریم:

$$\log\left(\frac{k(z)}{z}\right) = -2 \log(1-z) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} z^n.$$

بنابراین ضرایب لگاریتمی تابع کوبه برابر است با:

$$\gamma_n(k) = \frac{1}{n}, \quad (n \geq 1).$$

سوالی که احتمالاً به ذهن خواننده خطور می‌کند این است که آیا رده‌های از توابع تحلیلی وجود دارد که تساوی برای ضرایب لگاریتمی تابع کوبه برقرار باشد؟ جواب مثبت است. در واقع اگر f یک تابع ستاره‌وار باشد، آن‌گاه $\frac{1}{n} |\gamma_n(f)| \leq 1$ و تساوی برای ضرایب لگاریتمی تابع کوبه رخ می‌دهد. اما برآورد ضرایب لگاریتمی برای رده توابع تکارز U در حالت کلی برقرار نیست. در واقع اگر f تابعی تکارز و به صورت (۱) باشد داریم:

$$\gamma_1 = \frac{a_2}{2} \quad \text{و} \quad \gamma_2 = \frac{1}{2} \left(a_3 - \frac{a_2^2}{2} \right).$$

با استفاده از قضیه دوبرانژ (حدس بیبرباخ) و نامساوی فکته-ژگو^۴ [۳], برآوردهای دقیق زیر را داریم:

1. De Branges

2. Bieberbach

3. Koebe

4. Fekete-Szegő inequality

$$|\gamma_1| \leq \frac{1}{2}(1 + 2e^{-2}) \approx 0/635$$

برآورده دقيق γ_3 از تابع تکارز به همين آسانی نیست و اين يك از مسائل باز و مهم در نظریه تابع هندسی است. البته در اين زمينه نيز تلاش‌هایي نيز صورت‌گرفته که تاکنون بی‌نتیجه مانده است. لازماست به اين موضوع نيز اشاره کنیم که ضرایب لگاریتمی تابع نزدیک به محدب در این نامساوی دقیق صدق می‌کنند:

$$|\gamma_n| \leq \frac{A \log n}{n}$$

که در آن A يك ثابت است. اين برآورده دقيق به وسیله^۱ ثابت شده است [۱۵].

يکی دیگر از موضوعات مهم، نامساوی‌های دقیق شامل مجموع ضرایب لگاریتمی است. برای هر تابع تکارز f ضرایب لگاریتمی آن در این نامساوی صدق می‌کنند:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\gamma_n|^2 \leq \frac{\pi^2}{6}$$

و تساوی برای تابع کوبه برقرار است. همچنین برای هر $f \in U$ داریم:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^2 |\gamma_n|^2 \leq 4 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^2 \frac{1}{n^2} = \frac{2\pi^2 - 12}{3}.$$

يکی دیگر از اين نامساوی‌های مهم به قضیه بازیلویچ^۲ معروف است که بیان می‌کند برای هر $f \in U$ داریم:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \left| \gamma_n - \frac{1}{n} e^{-in\theta_0} \right|^2 \leq \frac{1}{2} \log \frac{1}{\kappa}$$

که در آن

$$\kappa = \lim_{r \rightarrow 1^-} (1-r)^2 |f(r)| \quad (0 < r < 1)$$

ثابت هایمن^۳ است. درواقع همواره $0 \leq \kappa \leq 1$ که f وقتی برقرار است که دورانی از تابع کوبه باشد [۴].

لم زیر (منبع [14] را ببینید) به منظور اثبات نتایج اصلی مفید است.

لم ۲. فرض کنید F و G دو تابع تحلیلی و محدب تکارز در قرص واحد باشند. اگر $F < G$ و $G < f$ ، آن‌گاه

$$f * g < F * G$$

در بخش بعدی با استفاده از مفهوم تبعیت، ابتدا قضیه‌ای در رابطه با اعضای S_s^* می‌آوریم. سپس با استفاده از این قضیه نامساوی شامل مجموع ضرایب لگاریتمی را به دست می‌آوریم. در آخر ضرایب لگاریتمی اعضای S_s^* را تخمین می‌زنیم.

نتایج اصلی

اولین نتیجه بدین صورت است.

قضیه ۳. فرض کنید f تابع تحلیلی و نرمال شده در قرص واحد Δ باشد. اگر $f \in S_s^*$ ، آن‌گاه

$$\log \left(\frac{f(z)}{z} \right) < \int_0^z \frac{\sin t}{t} dt \quad (z \in \Delta) \quad (2)$$

همچنین

1. Ye

2. Bazilevich

3. Hayman

$$\widehat{S}(z) := \int_0^z \frac{\sin t}{t} dt$$

محدب تکارز است.

اثبات: فرض می‌کنیم $f \in A$ در این صورت تابع $p(z) = \frac{f(z)}{z}$ در قرص واحد تحلیلی است و $p(0) = 1$. از این‌که f به S_S^* تعلق دارد داریم:

$$\frac{zp'(z)}{p(z)} = \frac{zf'(z)}{f(z)} - 1 < \sin z \quad (z \in \Delta) \quad (3)$$

از طرفی، چون تابع $\widehat{h}(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}$ محدب تکارز است ([12]), ازین‌رو، برای هر تابع تحلیلی ψ این تساوی برقرار است:

$$\psi(z) * \widehat{h}(z) = \int_0^z \frac{\psi(t)}{t} dt.$$

بنابراین با استفاده از لم ۲ و رابطه (3) داریم:

$$\frac{zp'(z)}{p(z)} * \widehat{h}(z) < \sin z * \widehat{h}(z),$$

یا به‌طور هم‌ارز

$$\int_0^z \frac{p'(t)}{p(t)} dt < \int_0^z \frac{\sin t}{t} dt.$$

و این رابطه تبعیت (۲) را نتیجه می‌دهد.

تحدب و تکارزی $\widehat{S}(z)$ ساده است. در واقع چون $\sin z$ و $\widehat{h}(z)$ محدب و تکارز هستند با استفاده از حدس پولیا – شوئنبرگ^۱ (این حدس در سال ۱۹۷۳ به‌وسیله راشوویه و شیل – اسمال^۲ ثابت شد، [۱۳]) حکم به‌دست می‌آید. این حدس بیان می‌کند که توابع محدب تکارز تحت ضرب پیچشی پایا هستند.

چون $\widehat{S}(z)$ محدب تکارز است از این‌رو، می‌توان نتیجه زیر را به‌دست آورد.

نتیجه ۴. اگر $f \in S_S^*$ باشد، آن‌گاه:

$$\frac{f(z)}{z} < \exp \widehat{S}(z).$$

در ادامه با به‌کارگیری قضیه ۴ به برآورد دقیق مجموع مربعات ضرایب لگاریتمی اعضای S_S^* می‌پردازیم. قضیه ۵. فرض کنید γ_n ضرایب لگاریتمی تابع f متعلق به رده S_S^* باشد. نامساوی دقیق برقرار است.

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\gamma_n|^2 \leq \frac{1}{2} (J_0(2) + I_0(2)) - \frac{5}{4}, \quad (4)$$

که

$$I_0(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{1}{4}z^2\right)^n}{(n!)^2},$$

تابع بسل اصلاح شده^۳ نوع اول و

1. Polya-Schoenberg conjecture
 2. Ruscheweyh and Sheil-Small
 3. Modified Bessel

$$J_0(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\left(\frac{1}{4}z^2\right)^n}{(n!)^2},$$

تابع بسل نوع اول است.

اثبات: از قضیه ۴ استفاده می‌کنیم. چون f متعلق به رده S_s^* است از این‌رو،

$$\log\left(\frac{f(z)}{z}\right) < \int_0^z \frac{\sin t}{t} dt.$$

با جای‌گذاری سری تیلور در رابطه تبعیت اخیر داریم:

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2\gamma_n z^n < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha_n}{n} z^n.$$

حال با به کارگیری نامساوی روجوسینسکی^۱ [۱۰]، و رابطه اخیر داریم:

$$\begin{aligned} 4 \sum_{n=1}^{\infty} |\gamma_n|^2 &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} |\alpha_n|^2 \\ &= |\alpha_1|^2 + \frac{1}{3^2} |\alpha_3|^2 + \frac{1}{5^2} |\alpha_5|^2 + \dots \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(n+1)(2n+1)!} \right)^2 \\ &= 2(J_0(2) + I_0(2)) - 5. \end{aligned}$$

که $J_0(2)$ و $I_0(2)$ در بالا تعریف شده‌اند. بنابراین نتیجه مطلوب بدست می‌آید. با یک محاسبه ساده می‌توان نشان

داد تساوی در نامساوی (۴) برای ضرایب لگاریتمی تابع

$$F(z) = z \exp \hat{S}(z).$$

برقرار است.

قضیه ۶. فرض کنید $f \in S_s^*$. آن‌گاه ضرایب لگاریتمی تابع f در این نامساوی دقیق صدق می‌کنند:

$$|\gamma_n| \leq \frac{1}{2n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

اثبات: فرض کنیم تابع f به رده تابع S_s^* تعلق داشته باشد. از این‌رو، با استفاده از تعریف ۱ داریم:

$$\frac{zf'(z)}{f(z)} - 1 < \sin z$$

یا به‌طور هم‌ارز

$$z \left(\log \frac{f(z)}{z} \right)' < \sin z$$

با جای‌گذاری بسط تیلور در رابطه تبعیت اخیر داریم:

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2n\gamma_n z^n < \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n z^n$$

حال با استفاده از قضیه روجوسینسکی^۲ برای تابع محدب داریم:

$$2n|\gamma_n| \leq |\alpha_1| = 1.$$

بنابراین

$$|\gamma_n| \leq \frac{1}{2n}.$$

در اینجا اثبات به پایان می‌رسد.

منابع

1. De Branges L., "A proof of the Bieberbach conjecture", *Acta Math.* 154 (1985) 137-152.
2. Duren P.L., "Univalent functions", Springer-Verlag (1983).
3. Fekete M., Szego G., "Eine Bemerkung über ungerade schlichte Funktionen", *J. London Math. Soc.* 8 (1933) 85-89.
4. Hayman W. K., "The asymptotic behaviour of p-valent functions", *Proc. London Math. Soc.* 5(1955) 257-284.
5. Kaplan W., "Close-to-convex schlicht functions", *Michigan Math. J.* 1(1952) 169-185.
6. Kargar R., Ebadian A., Sokol J., "On Booth lemniscate and starlike functions", *Anal. Math. Phys.* (2017). <https://doi.org/10.1007/s13324-017-0187-3>.
7. Kargar R., Ebadian A., Sokol J., "On subordination of some analytic functions", *Sib. Math. J.* 57(2016) 599-605.
8. Kargar R., Ebadian A., Sokol J., "Radius problems for some subclasses of analytic functions", *Complex Anal. Oper. Theory* 11(2017) 1639-1649.
9. Kuroki K., Owa S., "Notes on new class for certain analytic functions", *RIMS Kokyuroku Kyoto Univ.* 1772(2011) 21-25.
10. Rogosinski W., "On the coefficients of subordinate functions", *Proc. London Math. Soc.* 48(1943) 48-82.
11. Ruscheweyh St., "Convolution in Geometric Function Theory", Les Presses de l'Univ. de Montreal (1982).
12. Ruscheweyh St., "New criteria for univalent functions", *Proc. Amer. Math. Soc.* 49(1975) 109-115.
13. Ruscheweyh St., Sheil-Small T., "Hadamard product of schlicht functions and the Poincaré-Schoenberg conjecture", *Comm. Math. Helv.* 48(1973) 119-135.
14. Ruscheweyh St., Stankiewicz J., "Subordination under convex univalent function", *Bull. Pol. Acad. Sci. Math.* 33(1985) 499-502.
15. Ye Z., "The logarithmic coefficients of close-to-convex functions", *Bull. Instit. Math. Acad. Sin. (New Series)* 3(2008) 445-452.