

یک مسئله جدید مقدار ویژه معکوس برای ماتریس‌های ژاکوبی و سیستم جرم-فنر متناظر

حنیف میرزائی

دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده علوم پایه

پذیرش ۹۸/۰۳/۲۲

دریافت ۹۷/۰۷/۱۰


چکیده

ارتعاشات سیستم‌های مختلف مانند جرم-فنر، نخ کشسان، میله و غیره به صورت مسئله مقدار ویژه ماتریس ژاکوبی مدل‌بندی می‌شوند. مسئله تعیین ماتریس ژاکوبی با استفاده از داده‌های طیفی معلوم، مسئله مقدار ویژه معکوس ماتریس ژاکوبی گفته می‌شود. در این مقاله، ماتریس ژاکوبی J با استفاده از دو طیف و یک داده اضافی بازسازی می‌شود. یکی از طیف‌ها مقادیر ویژه ماتریس J و طیف دیگر مقادیر ویژه زیرماتریس حاصل از حذف هم‌زمان دو سطر و ستون ماتریس J است. شرایط لازم و کافی روی داده‌های طیفی را برای حل‌پذیری مسئله معکوس ارائه کرده و الگوریتم‌هایی برای تعیین ماتریس ژاکوبی J ارائه می‌گردد. سرانجام با ارائه چند مثال عددی ماتریس ژاکوبی و سیستم جرم-فنر متناظر بازسازی می‌شوند.

واژه‌های کلیدی: مسئله مقدار ویژه معکوس، ماتریس ژاکوبی، داده‌های طیفی، سیستم جرم-فنر.

مقدمه

تحلیل و طراحی مسائل فیزیک و مهندسی، نیاز به بررسی مدل‌های متناظر ریاضی دارند. این مدل‌ها را می‌توان به دو دسته از مسائل مستقیم و معکوس تقسیم‌بندی کرد. در ارتعاشات سازه‌ای، تجزیه و تخمین رفتار سیستم (پاسخ سیستم و فرکانس‌های طبیعی) از روی پارامترهای فیزیکی معلوم مسئله مستقیم و تعیین یا تخمین پارامترهای فیزیکی سیستم مانند چگالی، جرم، سختی، سطح مقطع و غیره از روی رفتار سیستم، مسئله معکوس نامیده می‌شود. شاخه‌ای از مسائل معکوس که در آن پارامترهای فیزیکی از روی داده‌های طیفی (مقادیر ویژه، بردارهای ویژه یا ترکیبی از آن‌ها) سیستم تعیین می‌شوند، مسائل مقدار ویژه معکوس نامیده می‌شود. شکل ۱، یک سیستم جرم-فنر را نشان می‌دهد.



شکل ۱. سیستم جرم-فنر

با استفاده از قانون دوم نیوتن و قانون هوک ارتعاشات آزاد سیستم با معادلات

$$M\ddot{\mathbf{u}} + K\mathbf{u} = 0, \quad (1)$$

توصیف می‌شود، که در آن \mathbf{u} بردار جابه‌جایی جرم‌ها است، $M = \text{diag}(m_1, m_2, \dots, m_n)$ ماتریس قطری جرم‌ها است و K ماتریس سه قطری حاصل از ضرایب سختی فنرها بدین صورت است:

$$K = \begin{pmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 & & & & \\ -k_2 & k_2 + k_3 & -k_3 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & & -k_{n-1} & k_{n-1} + k_n & -k_n \\ & & & & -k_n & k_n \end{pmatrix}.$$

با فرض ارتعاشات متناوب $\mathbf{u} = \mathbf{v} \sin(\omega t)$ معادله دیفرانسیل (۱) به شکل مسئله مقدار ویژه (۲) در می‌آید:

$$(K - \omega^2 M)\mathbf{v} = 0. \quad (2)$$

با فرض $M = D^2 = \text{diag}(d_1^2, \dots, d_n^2)$ و $\lambda = \omega^2$ معادله (۲) را می‌توان بدین صورت بازنویسی کرد:

$$(KD^{-1} - \lambda D)D\mathbf{v} = 0,$$

با ضرب طرفین معادله فوق از چپ در D^{-1} خواهیم داشت

$$JX = \lambda X, \quad J = D^{-1}KD^{-1}, \quad X = D\mathbf{v}, \quad (3)$$

ماتریس J ، یک ماتریس سه قطری متقارن به صورت زیر می‌باشد:

$$J = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & & & & \\ b_1 & a_2 & b_2 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & & b_{n-2} & a_{n-1} & b_{n-1} \\ & & & & b_{n-1} & a_n \end{pmatrix}, \quad (4)$$

که در آن

$$a_i = \frac{k_i + k_{i+1}}{m_i}, \quad b_i = -\frac{k_{i+1}}{d_i d_{i+1}}, \quad d_i^2 = m_i. \quad (5)$$

ماتریس J ، ماتریس ژاکوبی نامیده می‌شود. با توجه به موارد بالا، مقادیر ویژه ماتریس‌های (K, M) و J یکسان هستند. از طرفی به آسانی می‌توان نشان داد که ماتریس (K, M) دارای مقادیر ویژه مثبت است. بنابراین ماتریس J به صورت (۴) نیز دارای مقادیر ویژه مثبت است و با توجه به متقارن بودن، معین مثبت نیز هست. همچنین ماتریس‌های (K, M) و J دارای مقادیر ویژه متمایز هستند [۱]. بنابراین سیستم جرم-فنر به صورت مسئله مقدار ویژه ماتریس ژاکوبی مدل‌بندی می‌شود. از مسائل ارتعاشی دیگر که به صورت (۳) مدل‌بندی می‌شوند، می‌توان به سیستم ارتعاشی چرخشی شامل n دیسک، ارتعاشات n جرم نقطه‌ای روی یک نخ کشسان و غیره اشاره کرد [۱]. همچنین اگر سطح مقطع یک میله غیریکنواخت با سطوح تکه‌ای ثابت تقریب زده شود، آن‌گاه ارتعاشات میله تقریبی به صورت مسئله مقدار ویژه ماتریس ژاکوبی مدل‌بندی می‌شود [۲]. مسئله مقدار ویژه معکوس، برای سیستم جرم-فنر، تعیین جرم‌های m_i و سختی‌های فنر k_i و برای ماتریس ژاکوبی، تعیین درایه‌های a_i و b_i با استفاده از داده‌های طیفی است. روابط (۵) نشان می‌دهند که مسئله مقدار ویژه معکوس سیستم جرم-فنر با یک مسئله مقدار ویژه معکوس ماتریس ژاکوبی متناظر است. در [۱] ثابت شده است که برای هر ماتریس ژاکوبی معین مثبت به صورت (۴)، سیستم

جرم-فنر منحصربفرد با مجموع جرم‌های مشخص وجود دارد. تحقیق روی مسائل معکوس ماتریس‌های ژاکوبی با کار کرین^۱ در اتحاد جماهیر شوروی شروع شد. انگیزه اولیه او از بررسی چنین مسائلی این بود که این مسائل در تقریب مسائل اشتورم-لیوویل ظاهر می‌شوند [۱]. ماتریسی که از حذف سطر و ستون $(m+1)$ ام ماتریس J به دست می‌آید، با J_{m+1} نشان داده می‌شود. از نظر فیزیکی این ماتریس متناظر با یک سیستم جرم-فنر است که در آن جرم $(m+1)$ ام ثابت است. هم‌چنین ماتریسی که از حذف هم‌زمان سطر و ستون $(m+1)$ ام و $(m+r+2)$ ام ماتریس J حاصل می‌شود، با $J_{m+1, m+r+2}$ نشان داده می‌شود. از نظر فیزیکی این ماتریس متناظر با یک سیستم جرم-فنر است که در آن جرم‌های $(m+1)$ ام و $(m+r+2)$ ام ثابت است. مجموعه تمام مقادیر ویژه ماتریس J طیف آن ماتریس نامیده می‌شود و با $\sigma(J)$ نشان داده می‌شود. هاجستات^۲ برای اولین بار بازسازی ماتریس J را با استفاده از طیف‌های $\sigma(J)$ و $\sigma(J_1)$ بررسی کرد [۳]. وی نشان داد که حداکثر یک ماتریس J با این شرایط وجود دارد. هاجستات سعی کرد این ماتریس منحصربفرد را بازسازی کند [۴]. اما، نتوانست نشان دهد که روش او همیشه منجر به مقادیر حقیقی برای b_i ها می‌شود. هالد^۳ الگوریتم دیگری برای بازسازی ماتریس J ارائه کرد [۵]. و نشان داد که طیف‌های

$$\sigma(J_1) = \{\mu_i\}_{i=1}^{n-1} \text{ و } \sigma(J) = \{\lambda_i\}_{i=1}^n$$

یعنی،

$$0 < \lambda_1 < \mu_1 < \lambda_2 < \dots < \mu_{n-1} < \lambda_n.$$

هم‌چنین وی نشان داد که با توجه به این که مقادیر ویژه تو در تو هستند، الگوریتم بازسازی هاجستات [۴] منجر به مقادیر حقیقی برای b_i ها می‌شود. با استفاده از طیف‌های $\sigma(J) = \{\lambda_i\}_{i=1}^n$ و $\sigma(J_1) = \{\mu_i\}_{i=1}^{n-1}$ بردار $\mathbf{x}_1 = \{x_{1,i}\}$ ، مؤلفه‌های اول بردارهای ویژه متناظر با مقادیر ویژه λ_i ، به صورت (۶) به دست می‌آیند:

$$x_{1,i}^2 = \frac{\det(\lambda_i I - J_1)}{\prod_{j=1, j \neq i}^n (\lambda_i - \lambda_j)} = \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (\lambda_i - \mu_j)}{\prod_{j=1, j \neq i}^n (\lambda_i - \lambda_j)}, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (6)$$

هم‌چنین مؤلفه‌های آخر بردارهای ویژه متناظر با مقادیر ویژه λ_i به صورت (۷) به دست می‌آیند:

$$x_{n,i}^2 = \frac{\det(\lambda_i I - J_n)}{\prod_{j=1, j \neq i}^n (\lambda_i - \lambda_j)} = \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (\lambda_i - \bar{\mu}_j)}{\prod_{j=1, j \neq i}^n (\lambda_i - \lambda_j)}, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (7)$$

که در آن $\{\bar{\mu}_i\}_{i=1}^{n-1}$ طیف ماتریس J_n است. ماتریس ژاکوبی J را می‌توان با استفاده از مقادیر ویژه $\{\lambda_i\}_{i=1}^n$ و بردار \mathbf{x}_1 و به کمک الگوریتم لانکسوز بازسازی کرد [۱]. گلدول^۴ و ویلمز^۵ [۶] ماتریس J را به کمک طیف‌های $\sigma(J)$ و $\sigma(J_m)$ ، $2 \leq m \leq n-1$ ، بازسازی کردند. برای بازسازی ماتریس سه قطری و هم‌چنین بازسازی سیستم جرم-فنر دو طیف از مسئله باید معلوم باشند. گلدول [۷] فرض کرد که تنها طیف $\{\lambda_i\}_{i=1}^n$ معلوم باشد و طیف دوم جرم-فنر دو طیف از مسئله باید معلوم باشند. گلدول [۷] فرض کرد که تنها طیف $\{\lambda_i\}_{i=1}^n$ معلوم باشد و طیف دوم را با اعمال یک شرط کمینه‌سازی به دست آورد. وی طیف دوم را از کمینه کردن جرم کل سیستم

1. M. G. Krein
2. Hachusdat
3. Hald
4. Gladwell
5. Willms

به‌دست آورد. پورتر^۱ [۸]، [۹]، سیستم جرم-فجر را از روی دو مود به‌دست آورد اما، وی شرایط لازم و کافی روی بردارهای ویژه که منجر به جرم و سختی مثبت می‌شوند، را بحث نکرد. این شرایط را گلدول [۱۰] بررسی کرده است. گسسته‌سازی میله مرتعش غیریکنواخت با روش عناصر محدود به مسئله مقدار ویژه ماتریسی $JX = MX$ منجر می‌شود که در آن J ماتریس ژاکوبی و M ماتریس سه قطری معین مثبت است، مسئله مقدار ویژه معکوس چنین مسائلی در [۱۱]، [۱۲] و [۱۳] بررسی شده است. آیدین و همکارانش [۱۴] مسئله مقدار ویژه معکوس ماتریس ژاکوبی با عناصر روی قطر اصلی صفر را بررسی کردند. در [۱۵] و [۱۶] ماتریس ژاکوبی از مرتبه $2n$ و سیستم جرم-فجر متناظر با استفاده از مقادیر ویژه و زیرماتریس پیش‌رو اصلی بازسازی شده است. در [۱۷] ماتریس ژاکوبی با استفاده از سه طیف بازسازی شده است؛ که در آن به جای حذف سطر و ستون ماتریس، درایه‌هایی از قطر اصلی را تغییر داده‌اند. نظری و همکارانش [۱۸]، [۱۹] و [۲۰] مسئله مقدار ویژه معکوس ماتریس‌های فاصله، سه قطری نامنفی و ماتریس‌های متقارن نامنفی را بررسی کرده‌اند. در [۲۱، ۲۲، ۲۳] مسائل مقدار ویژه معکوس ماتریس‌های شبه ژاکوبی بررسی شده است. در این مقاله، مسئله مقدار ویژه معکوس با استفاده از یک مجموعه داده‌های جدید بدین صورت بررسی می‌شود:

مسئله مقدار ویژه معکوس: فرض کنید داده‌های طیفی $\{\lambda_i\}_{i=1}^N$ ، $\{\mu_i\}_{i=1}^m$ ، $\{v_i\}_{i=1}^r$ ، $\{\gamma_i\}_{i=1}^n$ و عدد β داده شده‌اند. ماتریس ژاکوبی J را چنان بیابید که داشته باشیم:

$$\sigma(J) = \{\lambda_i\}_{i=1}^N, \quad \sigma(J_{m+1, m+r+2}) = \{\mu_i\}_{i=1}^m \cup \{v_i\}_{i=1}^r \cup \{\gamma_i\}_{i=1}^n, \quad \beta = \prod_{j=m+1}^{m+r+1} b_j. \quad (8)$$

مطالب این مقاله به‌صورت زیر تدوین شده است. در بخش ۲، شرایط لازم روی داده‌های طیفی بررسی می‌شود. در بخش ۳، شرایط لازم و کافی برای وجود جواب مسئله مقدار ویژه معکوس بررسی و الگوریتمی برای بازسازی ماتریس ژاکوبی ارائه می‌شود. در بخش ۴، با ارائه چند مثال عددی درستی نتایج ارائه شده بررسی می‌شود.

شرایط لازم روی داده‌های طیفی

در این بخش، شرایط لازم روی داده‌های طیفی مسئله مقدار ویژه معکوس را به‌دست می‌آوریم.

ماتریس ژاکوبی J ، (۴) را می‌توان به‌صورت بلوکی (۹) نوشت:

$$J = \begin{pmatrix} A & \mathbf{b}_1 & 0 & 0 & 0 \\ \mathbf{b}_1^T & a_{m+1} & \mathbf{b}_2^T & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{b}_2 & B & \mathbf{b}_3 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{b}_3^T & a_{m+r+2} & \mathbf{b}_4^T \\ 0 & 0 & & \mathbf{b}_4 & C \end{pmatrix}, \quad (9)$$

که در آن A ، B و C به‌ترتیب ماتریس‌های ژاکوبی از مرتبه m ، r و n است، ماتریس J از مرتبه $N = m + r + n + 2$ است و

$$\mathbf{b}_1^T = (0, 0, \dots, b_m), \quad \mathbf{b}_2^T = (b_{m+1}, 0, 0, \dots, 0),$$

$$\mathbf{b}_3^T = (0, 0, \dots, b_{m+r+1}), \quad \mathbf{b}_4^T = (b_{m+r+2}, 0, 0, \dots, 0).$$

ماتریس‌های J_{m+1} ، J_{m+r+2} و $J_{m+1, m+r+2}$ به صورت بلوکی زیر نوشته می‌شوند:

$$J_{m+1} = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & H \end{pmatrix}, \quad J_{m+r+2} = \begin{pmatrix} P & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & C \end{pmatrix}, \quad J_{m+1, m+r+2} = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & C \end{pmatrix},$$

که در آن ماتریس‌های H و P بدین صورت هستند:

$$H = \begin{pmatrix} B & \mathbf{b}_3 & \mathbf{0} \\ \mathbf{b}_3^T & a_{m+r+2} & \mathbf{b}_4^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{b}_4 & C \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} A & \mathbf{b}_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{b}_1^T & a_{m+1} & \mathbf{b}_2^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{b}_2 & B \end{pmatrix}.$$

فرض کنید $\sigma(J) = \{\lambda_i\}_{i=1}^N$ و $\sigma(J_{m+1, m+r+2}) = \{\hat{\mu}_j\}_{j=1}^{N-2}$. ماتریس $J_{m+1, m+r+2}$ بلوکی قطری است بنابراین، مقادیر ویژه آن برابر با مجموعه تمام مقادیر ویژه ماتریس‌های A ، B و C است و با فرض $\sigma(A) = \{\mu_i\}_{i=1}^m$ ، $\sigma(B) = \{\nu_i\}_{i=1}^r$ و $\sigma(C) = \{\gamma_i\}_{i=1}^n$ می‌توان نوشت:

$$\{\hat{\mu}_j\}_{j=1}^{N-2} = \{\mu_i\}_{i=1}^m \cup \{\nu_i\}_{i=1}^r \cup \{\gamma_i\}_{i=1}^n.$$

در این مقاله، ماتریس ژاکوبی J (۹) را چنان بازسازی می‌کنیم که دارای طیف $\{\lambda_i\}_{i=1}^N$ و ماتریس متناظر $J_{m+1, m+r+2}$ دارای طیف $\{\hat{\mu}_j\}_{j=1}^{N-2}$ باشد. برای این کار، ابتدا شرایط لازم روی داده‌های طیفی $\{\lambda_i\}_{i=1}^N$ ، $\{\hat{\mu}_j\}_{j=1}^{N-2}$ و β را به دست می‌آوریم.

با توجه به شکل ماتریس J_{m+1} ، این ماتریس دارای طیف $\{\mu_i\}_{i=1}^m \cup \{\mu_i^*\}_{i=1}^{N-m-1}$ است که $\{\mu_i^*\}_{i=1}^{N-m-1}$ طیف ماتریس ژاکوبی H و $\{\mu_i\}_{i=1}^m$ طیف ماتریس A است. البته طیف $\{\mu_i^*\}_{i=1}^{N-m-1}$ داده نشده‌اند اما طبق [۱] طیف ماتریس‌های J و J_{m+1} باید حقیقی، مثبت و تو در تو باشند. بنابراین اعداد داده شده $\{\lambda_i\}_{i=1}^N$ و $\{\mu_i\}_{i=1}^m$ باید در این شرط صدق کنند:

i. مقادیر $\{\lambda_i\}_{i=1}^N$ حقیقی، متمایز و مثبت باشند و مقادیر ویژه $\{\lambda_k\}_{k=1}^m \subset \{\lambda_i\}_{i=1}^N$ وجود داشته باشند به طوری که

$$\lambda_{i_1} \leq \mu_1 < \lambda_{i_1+1}, \quad \lambda_{i_2} \leq \mu_2 < \lambda_{i_2+1}, \quad \dots, \quad \lambda_{i_m} \leq \mu_m < \lambda_{i_m+1}. \quad (10)$$

فرض کنید $\sigma(J_{m+r+2}) = \{\gamma_i\}_{i=1}^n \cup \{\gamma_i^*\}_{i=1}^{N-n-1}$ که $\{\gamma_i^*\}_{i=1}^{N-n-1}$ طیف ماتریس ژاکوبی P و $\{\gamma_i\}_{i=1}^n$ طیف ماتریس C است. طبق تو در تو بودن طیف‌ها مقادیر $\{\gamma_i\}_{i=1}^n$ باید در این شرط صدق کنند:

ii. مقادیر ویژه $\{\lambda_k\}_{k=1}^n \subset \{\lambda_i\}_{i=1}^N$ وجود داشته باشند به طوری که

$$\lambda_{j_1} \leq \gamma_1 < \lambda_{j_1+1}, \quad \lambda_{j_2} \leq \gamma_2 < \lambda_{j_2+1}, \quad \dots, \quad \lambda_{j_n} \leq \gamma_n < \lambda_{j_n+1}. \quad (11)$$

حال ماتریس ژاکوبی H را در نظر بگیرید. از حذف سطر و ستون $(r+1)$ ام آن، ماتریس

$$H_{r+1} = \begin{pmatrix} B & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & C \end{pmatrix},$$

به دست می‌آید. ماتریس H_{r+1} دارای طیف $\{\hat{\nu}_i\}_{i=1}^{r+n} = \{\nu_i\}_{i=1}^r \cup \{\gamma_i\}_{i=1}^n$ است و طیف‌های $\{\mu_i^*\}_{i=1}^{N-m-1}$ و $\{\hat{\nu}_i\}_{i=1}^{r+n}$ تو در تو هستند یعنی

$$\mu_1^* \leq \hat{\nu}_1 < \mu_2^* \leq \hat{\nu}_2 < \dots \leq \hat{\nu}_{N-m-2} < \mu_{N-m-1}^*, \quad (12)$$

فرض کنید $\{\lambda_{m_i}\}_{i=1}^{N-m-1}$ زیر دنباله‌ای از $\{\lambda_i\}_{i=1}^N$ باشد که بین λ_{m_i} و λ_{m_i+1} هیچ کدام از μ_i ها قرار نداشته باشند،

بنابراین طبق تو در تو بودن مقادیر ویژه، μ_i^* ها بین این مقادیر ویژه قرار دارند؛ به عبارت دیگر

$$\lambda_{m_1} \leq \mu_1^* < \lambda_{m_1+1}, \quad \lambda_{m_2} \leq \mu_2^* < \lambda_{m_2+1}, \quad \dots, \quad \lambda_{m_{N-m-1}} \leq \mu_{N-m-1}^* < \lambda_{m_{N-m-1}+1}. \quad (13)$$

از نامساوی‌های (۱۲) و (۱۳) نتیجه می‌شود که مقادیر ویژه $\{\hat{\nu}_i\}_{i=1}^{r+n}$ باید در این شرط صدق کنند:

.iii

$$\lambda_{j_1} \leq \hat{\nu}_1 < \lambda_{j_2+1}, \quad \hat{\nu}_1 \leq \hat{\nu}_2 < \lambda_{j_3+1}, \quad \dots, \quad \hat{\nu}_{N-m-1} \leq \hat{\nu}_{N-m-2} < \lambda_{j_{N-m-1}+1}. \quad (14)$$

از حذف سطر و ستون $(m+1)$ ام ماتریس P ، ماتریس

$$P_{m+1} = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B \end{pmatrix},$$

به دست می‌آید. فرض کنید $\sigma(P_{m+1}) = \{\hat{\gamma}_i\}_{i=1}^{m+r} = \{\mu_i\}_{i=1}^m \cup \{\nu_i\}_{i=1}^r$ و $\{\hat{\gamma}_i\}_{i=1}^{m+r}$ و $\{\gamma_i^*\}_{i=1}^{N-n-1}$ طیف‌های

تو در تو هستند، یعنی

$$\gamma_1^* \leq \hat{\gamma}_1 < \gamma_2^* \leq \hat{\gamma}_2 < \dots \leq \hat{\gamma}_{N-n-2} < \gamma_{N-n-1}^*. \quad (15)$$

فرض کنید $\{\lambda_{n_i}\}_{i=1}^{N-n-1}$ زیر دنباله‌ای از $\{\lambda_i\}_{i=1}^N$ باشد که بین λ_{n_i} و λ_{n_i+1} هیچ کدام از γ_i ها قرار نداشته باشند،

بنابراین طبق در هم تو در تو بودن مقادیر ویژه، γ_i^* ها بین این مقادیر ویژه قرار دارند؛ به عبارت دیگر

$$\lambda_{n_1} \leq \gamma_1^* < \lambda_{n_1+1}, \quad \lambda_{n_2} \leq \gamma_2^* < \lambda_{n_2+1}, \quad \dots, \quad \lambda_{n_{N-n-1}} \leq \gamma_{N-n-1}^* < \lambda_{n_{N-n-1}+1}. \quad (16)$$

از نامساوی‌های (۱۵) و (۱۶) نتیجه می‌شود که مقادیر ویژه $\{\hat{\gamma}_i\}_{i=1}^{m+r}$ باید در این شرط صدق کنند:

.iv

$$\lambda_{n_1} \leq \hat{\gamma}_1 < \lambda_{n_2+1}, \quad \hat{\gamma}_1 \leq \hat{\gamma}_2 < \lambda_{n_3+1}, \quad \dots, \quad \hat{\gamma}_{N-n-1} \leq \hat{\gamma}_{N-n-2} < \lambda_{n_{N-n-1}+1}. \quad (17)$$

طبق روابط (۵) مقادیر b_i ها در ماتریس ژاکوبی منفی است، بنابراین طبق رابطه (۸) مقدار β باید در نامساوی (۱۸) صدق کند:

.v

$$(-1)^{r+1} \beta > 0. \quad (18)$$

مطالب مذکور در قضیه ۱ جمع بندی شده است:

قضیه ۱. اگر ماتریس ژاکوبی J با طیف‌های (۸) جواب مسئله مقدار ویژه معکوس باشد، آن گاه داده‌های طیفی باید در نامساوی‌های (۱۰)، (۱۱)، (۱۴)، (۱۷) و (۱۸) صدق کنند.

بازسازی ماتریس ژاکوبی

در این بخش، الگوریتمی برای بازسازی ماتریس ژاکوبی J با استفاده از داده‌های طیفی معلوم ارائه می‌شود.

$$\left\{ \begin{aligned} & \left\{ \sum_{j=1}^m \frac{s_j^2}{\lambda_i - \mu_j} + \sum_{j=1}^r \frac{t_j^2}{\lambda_i - \nu_j} + (a_{m+1} - \lambda_i) \right\} \left\{ \sum_{j=1}^m \frac{u_j^2}{\lambda_i - \nu_j} + \sum_{j=1}^r \frac{v_j^2}{\lambda_i - \gamma_j} + (a_{m+r+1} - \lambda_i) \right\} \\ & = \beta^2 \left\{ \sum_{j=1}^r \frac{1}{\Lambda_j (\lambda_i - \nu_j)} \right\}^2, \quad i = 1, \dots, N, \\ & t_i u_i = \frac{\beta}{\Lambda_i}, \quad i = 1, \dots, r, \\ & a_{m+1} + a_{m+r+2} = \sum_{i=1}^N \lambda_i - \sum_{i=1}^{N-2} \hat{\mu}_i. \end{aligned} \right. \quad (21)$$

اثبات. لزوم. فرض کنید ماتریس J جواب مسئله مقدار ویژه معکوس باشد که داده‌های طیفی آن به صورت (۸) است. دستگاه معادلات (۱۹) را می‌توان به صورت (۲۲) نوشت:

$$\left\{ \begin{aligned} & (\mu_j - \lambda) p_j + s_j x_{m+1} = 0, \quad j = 1, 2, \dots, m, \\ & \sum_{j=1}^m s_j p_j + (a_{m+1} - \lambda) x_{m+1} + \sum_{j=1}^r t_j h_j = 0, \\ & t_j x_{m+1} + (\nu_j - \lambda) h_j + u_j x_{m+r+2} = 0, \quad j = 1, 2, \dots, n, \\ & \sum_{j=1}^n u_j h_j + (a_{m+r+2} - \lambda) x_{m+r+2} + \sum_{j=1}^n v_j w_j = 0, \\ & v_j x_{m+r+2} + (\gamma_j - \lambda) w_j = 0, \quad j = 1, 2, \dots, n. \end{aligned} \right. \quad (22)$$

با محاسبه مقادیر p_j ، h_j و w_j به ترتیب از معادلات اول، سوم و پنجم در (۲۲) سپس جای‌گذاری روابط حاصل در معادلات دوم و چهارم در (۲۲) داریم:

$$\left\{ \begin{aligned} & \left[\sum_{j=1}^m \frac{s_j^2}{\lambda - \mu_j} + \sum_{j=1}^r \frac{t_j^2}{\lambda - \nu_j} + (a_{m+1} - \lambda) \right] x_{m+1} + \sum_{j=1}^r \frac{t_j u_j}{\lambda - \nu_j} x_{m+r+2} = 0, \\ & \sum_{j=1}^r \frac{t_j u_j}{\lambda - \nu_j} x_{m+1} + \left[\sum_{j=1}^m \frac{u_j^2}{\lambda - \nu_j} + \sum_{j=1}^r \frac{v_j^2}{\lambda - \gamma_j} + (a_{m+r+2} - \lambda) \right] x_{m+r+2} = 0. \end{aligned} \right. \quad (23)$$

طبق لم ۲ دترمینان ماتریس ضرایب در (۲۳) به‌ازای $\lambda = \{\lambda_i\}_{i=1}^N$ صفر است و دستگاه معادلات (۲۴) به‌دست می‌آید:

$$\left\{ \begin{aligned} & \left\{ \sum_{j=1}^m \frac{s_j^2}{\lambda_i - \mu_j} + \sum_{j=1}^r \frac{t_j^2}{\lambda_i - \nu_j} + (a_{m+1} - \lambda_i) \right\} \left\{ \sum_{j=1}^m \frac{u_j^2}{\lambda_i - \nu_j} + \sum_{j=1}^r \frac{v_j^2}{\lambda_i - \gamma_j} + (a_{m+r+2} - \lambda_i) \right\} \\ & - \left\{ \sum_{j=1}^r \frac{t_j u_j}{\lambda_i - \nu_j} \right\}^2 = 0, \quad i = 1, \dots, N. \end{aligned} \right. \quad (24)$$

با اعمال بند ج لم ۱ برای ماتریس ژاکوبی B داریم:

$$z_{ri} = \frac{\det(v_i I - B_r)}{\prod_{j=m+2}^{m+r} b_j} z_{1i}, \quad i = 1, \dots, r. \quad (25)$$

از طرفی بنا بر (۷) داریم:

$$z_{ri}^2 = \frac{\det(v_i I - B_r)}{\prod_{j=1, j \neq i}^r (v_i - v_j)}, \quad i = 1, \dots, r. \quad (26)$$

روابط (۲۵) و (۲۶) نتیجه می‌دهند که

$$z_{1i} z_{ri} = \frac{\prod_{j=m+2}^{m+r} b_j}{\prod_{j=1, j \neq i}^r (v_i - v_j)}, \quad i = 1, \dots, r, \quad (27)$$

از روابط (۲۰) و (۲۷) نتیجه می‌شود:

$$t_i u_i = \frac{\beta}{\Lambda_i}, \quad i = 1, \dots, r. \quad (28)$$

که در آن $\beta = \prod_{j=m+1}^{m+r+1} b_j$ و $\Lambda_i = \prod_{j=1, j \neq i}^r (v_i - v_j)$ با به کار بردن فرمول اثر برای ماتریس‌های J و $J_{m+1, m+r+2}$ به دست می‌آوریم:

$$a_{m+1} + a_{m+r+2} = \sum_{i=1}^N \lambda_i - \sum_{i=1}^{N-2} \hat{\mu}_i, \quad (29)$$

معادلات (۲۴)، (۲۸) و (۲۹) دستگاه معادلات (۲۱) را نتیجه می‌دهند.

کفایت. فرض کنید $\{s_j\}_{j=1}^m$ ، $\{t_j\}_{j=1}^r$ ، $\{u_j\}_{j=1}^r$ و $\{v_j\}_{j=1}^n$ جواب دستگاه معادلات (۲۱) باشند. با توجه به این که بردارهای \mathbf{y}_m ، \mathbf{z}_1 ، \mathbf{z}_r و \mathbf{q}_1 یک‌ه است، معادلات (۲۰) نتیجه می‌دهند:

$$b_m^2 = \sum_{j=1}^m s_j^2, \quad b_{m+1}^2 = \sum_{j=1}^r t_j^2, \quad b_{m+r+1}^2 = \sum_{j=1}^r u_j^2, \quad b_{m+r+2}^2 = \sum_{j=1}^n v_j^2. \quad (30)$$

با استفاده دوباره از معادلات (۲۰) به دست می‌آوریم:

$$\begin{cases} y_{m,j} = \frac{s_j}{b_m}, \quad j = 1, \dots, m, & q_{1,k} = \frac{v_k}{b_{m+r+2}}, \quad k = 1, \dots, n, \\ z_{1,i} = \frac{t_i}{b_{m+1}}, \quad z_{r,i} = \frac{u_i}{b_{m+r+1}}, \quad i = 1, \dots, r. \end{cases} \quad (31)$$

با داشتن $\{y_{m,j}\}_{j=1}^m$ ، $\{z_{1,i}\}_{i=1}^r$ و $\{q_{1,k}\}_{k=1}^n$ می‌توان با استفاده از الگوریتم لانکسوز [۱] ماتریس‌های ژاکوبی معین مثبت A ، B و C را بازسازی کرد. همچنین دو درایه a_{m+1} و a_{m+r+2} از ماتریس J جواب دستگاه معادلات (۲۱) است. بدین ترتیب ماتریس J به شکل (۹) بازسازی می‌شود و مسئله مقدار ویژه معکوس جواب دارد. می‌توان با الگوریتم زیر ماتریس ژاکوبی J را بازسازی کرد:

الگوریتم ۱.

گام ۱. دستگاه معادلات (۲۱) را حل کرده و مقادیر $\{s_j\}_{j=1}^m$ ، $\{t_j\}_{j=1}^r$ ، $\{u_j\}_{j=1}^r$ ، $\{v_j\}_{j=1}^n$ ، a_{m+1} و a_{m+r+2} را به دست آورید.

گام ۲. از روابط (۳۰) مقادیر b_m ، b_{m+1} ، b_{m+r+1} و b_{m+r+2} را محاسبه کنید.

گام ۳. از روابط (۳۱) مقادیر $\{y_{m,j}\}_{j=1}^m$ ، $\{q_{1,j}\}_{j=1}^n$ ، $\{z_{1,j}\}_{j=1}^r$ و $\{z_{r,j}\}_{j=1}^r$ را محاسبه کنید.

گام ۴. به کمک الگوریتم لانکسوز [۱] ماتریس‌های A ، B و C را بازسازی کنید.

به‌ازای $r=0$ و مقادیر دلخواه m و n می‌توان قضیه ۳ را برای وجود جواب مسئله مقدار ویژه معکوس بیان کرد:

قضیه ۳. فرض کنید $r=0$ ، $P(\lambda) = \prod_{i=1}^N (\lambda - \mu_i)$ ، $Q(\lambda) = \prod_{i=1}^m (\lambda - \mu_i)$ و $R(\lambda) = \prod_{i=1}^n (\lambda - \gamma_i)$ ،

داده‌های طیفی $\{\lambda_i\}_{i=1}^N$ و $\{\hat{\mu}_j\}_{j=1}^{N-2}$ متمایز و در شرایط قضیه ۱ صدق می‌کنند. آن‌گاه مسئله مقدار ویژه معکوس

دارای جواب است اگر و تنها اگر چندجمله‌ای

$$F(\lambda) = P(\lambda) + \beta^2 Q(\lambda)R(\lambda),$$

دارای $m+1$ ریشه متمایز $\{\gamma_i^*\}_{i=1}^{m+1}$ باشد که در شرایط (۱۵) و (۱۶) صدق می‌کنند.

اثبات. لزوم. فرض کنید ماتریس ژاکوبی J جواب مسئله با داده‌های طیفی (λ) باشد. بنابراین ماتریس ژاکوبی P با

مقادیر ویژه $\{\gamma_i^*\}_{i=1}^{m+1}$ وجود دارد به‌طوری‌که γ_i^* ها در شرایط (۱۵) و (۱۶) صدق می‌کنند. ثابت می‌کنیم $\{\gamma_i^*\}_{i=1}^{m+1}$

ریشه‌های چندجمله‌ای $F(\lambda)$ می‌باشند. طبق لم ۱ داریم:

$$x_{m+1} = \frac{\prod_{i=1}^m (\lambda - \mu_i)}{\prod_{i=1}^m b_i} x_1, \quad x_{m+2} = \frac{\prod_{i=1}^{m+1} (\lambda - \gamma_i^*)}{\prod_{i=1}^{m+1} b_i} x_1. \quad (32)$$

با جای گذاری مقادیر (۳۲) در معادله دوم دستگاه معادلات (۲۳) به‌دست می‌آوریم:

$$\beta^2 \prod_{j=1}^m (\lambda - \mu_j) + \left[\sum_{j=1}^n \frac{v_j^2}{(\lambda - \gamma_j)} + a_{m+2} - \lambda \right] \prod_{j=1}^{m+1} (\lambda - \gamma_j^*) = 0, \quad \forall \lambda = \lambda_i, \quad i=1, \dots, N. \quad (33)$$

طرف اول در معادله (۳۳) یک کسر گویا با درجه صورت و مخرج به ترتیب N و n است که $\{\lambda_i\}_{i=1}^N$ و $\{\gamma_i^*\}_{i=1}^{m+1}$

به ترتیب صفرها و قطب‌های ساده آن هستند، بنابراین می‌توان نوشت:

$$\beta^2 \prod_{j=1}^m (\lambda - \mu_j) + \left[\sum_{j=1}^n \frac{v_j^2}{(\lambda - \gamma_j)} + a_{m+2} - \lambda \right] \prod_{j=1}^{m+1} (\lambda - \gamma_j^*) = -\frac{P(\lambda)}{R(\lambda)}. \quad (34)$$

با محاسبه حد دو طرف معادله (۳۴) به‌ازای $\lambda \rightarrow \gamma_j^*$ داریم:

$$P(\gamma_j^*) + \beta^2 Q(\gamma_j^*)R(\gamma_j^*) = 0, \quad j=1, \dots, m+1,$$

بنابراین چندجمله‌ای $F(\lambda)$ دارای $m+1$ ریشه است که در شرایط (۱۵) و (۱۶) صدق می‌کنند.

کفایت. حال فرض کنید چندجمله‌ای $F(\lambda)$ دارای $m+1$ ریشه متمایز $\{\gamma_i^*\}_{i=1}^{m+1}$ باشد که در شرایط (۱۵) و (۱۶)

صدق می‌کنند؛ ثابت می‌کنیم مسئله مقدار ویژه معکوس دارای جواب است. فرض کنید:

$$\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - P) = \prod_{i=1}^{m+1} (\lambda - \gamma_i^*),$$

با ضرب دو طرف معادله (۳۳) در $(\lambda - \gamma_j)$ و سپس محاسبه حد دو طرف به‌ازای $\lambda \rightarrow \gamma_j$ به‌دست می‌آوریم:

$$v_j^2 = -\frac{P(\gamma_j)}{R'(\gamma_j)\varphi(\gamma_j)}, \quad j=1, \dots, n. \quad (35)$$

با جای‌گذاری مقادیر (۳۲) در معادله اول دستگاه معادلات (۲۳) به‌دست می‌آوریم:

$$\sum_{j=1}^m \frac{s_j^2}{\lambda - \mu_j} + a_{m+1} - \lambda = -\frac{\varphi(\lambda)}{Q(\lambda)}.$$

با ضرب دو طرف معادله فوق در $(\lambda - \mu_j)$ و سپس محاسبه حد دو طرف به‌ازای $\lambda \rightarrow \mu_j$ به‌دست می‌آوریم:

$$s_j^2 = -\frac{\varphi(\mu_j)}{Q'(\mu_j)}, \quad j=1, \dots, m. \quad (۳۶)$$

با توجه به تو در تو بودن طیف‌ها عبارت طرف راست در روابط (۳۵) و (۳۶) مثبت است. با معلوم بودن مقادیر s_j و v_j مشابه قضیه ۲ ماتریس‌های ژاکوبی A و C بازسازی می‌شوند (در حالت $r=0$ ماتریس B را نداریم). با به‌کار

بردن فرمول اثر برای ماتریس‌های J و J_{m+2} و ماتریس‌های $J_{m+1, m+2}$ ، داریم:

$$a_{m+2} = \sum_{i=1}^N \lambda_i - \sum_{i=1}^{m+1} \gamma_i^* - \sum_{i=1}^n \gamma_i, \quad a_{m+1} = \sum_{i=1}^{m+1} \gamma_i^* - \sum_{i=1}^m \mu_i.$$

هم‌چنین با توجه به داده‌های طیفی داریم:

$$b_{m+1} = \beta. \quad (۳۷)$$

بنابراین ماتریس ژاکوبی J بازسازی می‌شود و مسئله دارای جواب است.

در حالت $r=0$ می‌توان با الگوریتم زیر ماتریس ژاکوبی J را بازسازی کرد:

الگوریتم ۲.

گام ۱. ریشه‌های چندجمله‌ای $F(\lambda)$ را محاسبه کرده و $m+1$ ریشه متمایز $\{\gamma_i^*\}_{i=1}^{m+1}$ که در شرایط (۱۵) و (۱۶) صدق می‌کنند را انتخاب کنید.

گام ۲. از روابط (۳۵) و (۳۶) مقادیر $\{v_j\}_{j=1}^n$ و $\{s_j\}_{j=1}^m$ را محاسبه کنید.

گام ۳. از روابط (۳۰) b_m و b_{m+2} و از (۳۷) مقدار b_{m+1} را محاسبه کنید.

گام ۴. به‌کمک الگوریتم لانکسوز [۱] ماتریس‌های A و C را بازسازی کنید.

در این مقاله، به‌ازای مقادیر دیگر r دستگاه معادلات (۲۱) به‌روش نیوتن حل شده است.

با داشتن ماتریس ژاکوبی J می‌توان سیستم جرم-فتر متناظر را به‌کمک الگوریتم موجود در [۱] بازسازی کرد. در

مثال‌های عددی بخش ۴ این کار انجام شده است.

نتایج عددی

در این بخش با ارائه چند مثال عددی، الگوریتم بخش قبل را برای بازسازی ماتریس ژاکوبی و سیستم جرم-فتر

متناظر بکار می‌بریم.

مثال ۱. فرض کنید داده‌های طیفی مسئله مقدار ویژه معکوس بدین‌صورت باشند:

$$\begin{aligned} \{\lambda_i\}_{i=1}^8 &= \{2 & 37\} \\ \{\mu_i\}_{i=1}^2 &= \{61, 183\}, \quad \{\mu_i\}_{i=1}^2 = \{62, 185\}, \quad \{\gamma_i\}_{i=1}^6 = \{25, 163\}, \\ \beta &= -232366. \end{aligned}$$

طبق داده‌های مسئله $N = 8$ و $m = r = n = 2$. واضح است که داده‌های طیفی در شرایط قضیه ۱ صدق می‌کنند. ماتریس ژاکوبی متناظر طبق الگوریتم بدین صورت به دست می‌آید:

$$J = \begin{bmatrix} 147.7449 & -55.3010 & & & & & & & \\ -55.3010 & 96.2551 & -86.8734 & & & & & & \\ & -86.8734 & 105.0000 & -0.0842 & & & & & \\ & & -0.0842 & 91.6298 & -52.5979 & & & & \\ & & & -52.5979 & 155.3702 & -52.3758 & & & \\ & & & & -52.3758 & 136.0000 & -66.8414 & & \\ & & & & & -66.8414 & 151.7718 & -37.7282 & \\ & & & & & & -37.7282 & 36.2282 & \end{bmatrix}$$

سختی‌های فنر و جرم‌های سیستم جرم-فنر متناظر بدین صورت است:

$$\{m_i\} = M\{0.1211, 0.1174, 0.1244, 0.1261, 0.1285, 0.1342, 0.1295, 0.1186\},$$

$$\{k_i\} = M\{7.2064 \quad 7.2712 \quad 7.3550 \quad 7.3748 \quad 7.8195 \quad 8.4382 \quad 8.0179 \quad 7.8070\},$$

که در آن M جرم کل سیستم است. محاسبه طیف ماتریس J درستی نتایج را تأیید می‌کند.

مثال ۲. فرض کنید داده‌های طیفی مسئله مقدار ویژه معکوس بدین صورت داده شده است:

$$\{\lambda_i\}_{i=1}^{15} = \{1.3229 \quad 352.3597 \quad .9471 \quad 8, \quad 32.4185\},$$

$$\{\mu_i\}_{i=1}^7 = \{36.1155 \quad 509 \quad \},$$

$$\{\gamma_i\}_{i=1}^6 = \{11.1602 \quad 416 \quad \},$$

$$\beta = -234.7826.$$

ماتریس ژاکوبی متناظر را بازسازی می‌کنیم. طبق داده‌های مسئله $N = 15$, $r = 0$, $m = 7$ و $n = 6$. واضح است که داده‌های طیفی در شرایط قضیه ۱ صدق می‌کنند. ریشه‌های چندجمله‌ای $F(\lambda)$ که در شرایط (۱۵) و (۱۶) صدق می‌کنند، بدین صورت است:

$$\{\gamma_i^*\}_{i=1}^8 = \{28.5760, 87.3925, 110.9031, 232.1002, 237.0352, 391.7558, 417.2856, 556.3976, 610.9288, 711.0871, 779.5367, 837.1224, 919.2890\}.$$

ریشه‌های چندجمله‌ای در شرایط قضیه ۳ صدق می‌کنند. همچنین به پنج تا از γ_i^* ها دو انتخاب ممکن وجود دارد (زیر آن‌ها خط کشیده شده است). بنابراین طبق قضیه ۳، مسئله مقدار ویژه معکوس متناظر با داده‌های مذکور دارای ۳۲ جواب است. با انتخاب

$$\{\gamma_i^*\}_{i=1}^8 = \{28.5760 \quad 58 \quad 779.5367, \quad 890\},$$

ماتریس ژاکوبی با الگوریتم ۲ بدین صورت بازسازی می‌شود:

$$\{a_i\}_{i=1}^{15} = \{493.6251, 445.2201, 441.5448, 440.1674, 5862, 517.7157, 03462\},$$

$$\{b_i\}_{i=1}^{14} = -\{241.5326, 254.5736, 234.7826, 1.3547, 4083, 23, 220.02733, 1, 2\}.$$

سیستم جرم و فنر متناظر بدین‌صورت است:

$$\{m_i\} = M\{0.0289, 0.0540, 72\},$$

$$\{k_i\} = M\{5.5821, 1, 21, 219, 6070\},$$

محاسبه طیف ماتریس به‌دست آمده درستی نتایج را تأیید می‌کند.

مثال ۲. فرض کنید داده‌های طیفی مسئله مقدار ویژه معکوس بدین‌صورت داده شده است:

$$\{\lambda_i\}_{i=1}^{12} = \{1.3144, 20.4457, 57.3293, 109.7336, 174.3673, 247.1681, 323.5590, 70, 571.6528, 600.0172\},$$

$$\{\mu_i\}_{i=1}^3 = \{90.6098, 309.4149, 528.1275\}, \quad \{v_i\}_{i=1}^3 = \{89.1772, 304.4952, 519.7683\},$$

$$\{\gamma_i\}_{i=1}^4 = \{15.4396, 148.5976, 352.4692, 531.7168\}, \quad \beta = 537477120.$$

می‌خواهیم ماتریس ژاکوبی متناظر را بازسازی کنیم. طبق داده‌های مسئله $N = 12$ ، $r = 3$ ، $m = 3$ و $n = 4$. واضح است که داده‌های طیفی در شرایط قضیه ۱ صدق می‌کنند. با حل دستگاه معادلات (۲۱) به‌روش نیوتن به‌دست می‌آوریم:

$$\{s_j\} = \{77.1493\}, \quad \{t_j\} = \{.2791\}$$

$$\{u_j\} = \{75.9992 - \dots\}, \quad a_{m+1} = .5627, \quad a_{m+r+2} = 302.76,$$

$$\{v_j\} = \{33.2458\}$$

از روابط (۳۰) و (۳۱) به‌دست می‌آوریم:

$$b_3 = -153.6001, \quad b_4 = - \quad b_7 = - \quad b_8 = -$$

$$\{y_{3,j}\} = \{0.502274, 0.708897, 0.495163\},$$

$$\{z_{1,j}\} = \{0.498557, 0.706006, 0.502988\},$$

$$\{z_{3,j}\} = \{0.501383, -0.708192, 0.497070\},$$

$$\{q_{1,j}\} = \{0.219879, 0.576151, 0.657709, 0.432576\}.$$

ماتریس ژاکوبی J طبق الگوریتم ۱ بدین‌صورت بازسازی می‌شود:

$$\{a_i\}_{i=1}^{12} = \{311.0059, 309.3061, 307.8401, 306.5627, 305.4393, 304.4445, \\ 303.5569, 302.7600, 302.0407, 301.3883, 300.7939, 144.0003\},$$

$$\{b_i\}_{i=1}^{11} = -\{155.0769, 154.2858, 153.6001, 152.9998, 152.4705, 152.0001, \\ 151.5791, 151.2000, 150.8571, 150.5455, 150.2609\}.$$

سیستم جرم- فنر متناظر بدین صورت است:

$$\{m_i\} = M \{ 0.0398$$

$$\} \\ \{k_i\} = M \{ 5.7259 \quad 9.7918 \quad 1 \quad 8 \quad 1 \\ 13.5530 \quad 92 \quad \}.$$

نتیجه‌گیری

در این مقاله، الگوریتمی برای بازسازی ماتریس ژاکوبی با استفاده از دو طیف و یک داده اضافی بررسی شد. جزئیات روش بازسازی و داده‌های طیفی مورد نیاز برای حالتی که دو سطر و ستون از ماتریس ژاکوبی حذف می‌شوند، ارائه شد. این مسئله را می‌توان برای حالتی که تعداد بیش‌تری از سطرها و ستون‌های ماتریس ژاکوبی حذف می‌شوند، نیز توسیع داد. هم‌چنین می‌توان دربارهٔ امکان توسیع الگوریتم مقاله، به مسئله مقدار ویژه $JX = \lambda MX$ که در گسسته‌سازی میله مرتعش غیریکنواخت با روش عناصر محدود ظاهر می‌شود؛ بررسی کرد.

منابع

1. Gladwell G. M. L., "Inverse problem in vibration", New York: Kluwer academic publishers (2004).
2. Singh K. V., "The transcendental eigenvalue problem and its application in system identification, Department of mechanical engineering", Phd thesis, Louisiana State University (2003).
3. Hochstadt H., "On some inverse problems in matrix theory", Archiv der Mathematik, 18 (2) (1967) 201-207.
4. Hochstadt H., "On the reconstruction of a Jacobi matrix from spectral data", Linear Alegbra and its Applications, 68 (8) (1947) 435-446.
5. Hald O. H., "Inverse eigenvalue problems for Jacobi matrices", Linear Alegbra and its Applications, 14 (1) (1976) 63-85.
6. Gladwell G. M. L., Willms N. B., "The reconstruction of a tridiagonal system from its frequency response at an interior point ", Inverse Problems, 4 (87) (1988) 1018-1024.
7. Gladwell G. M. L., "Minimal mass solutions to inverse eigenvalue problem"s, Inverse problems, 22 (2) (2006) 539-551.

8. Porter B., "Synthesis of lumped-parameter vibrating systems by an inverse Holzer technique", *Journal of Mechanical Engineering Science*, 12(1) (1970) 17-19.
9. Porter B., "Synthesis of lumped-parameter vibrating systems using transfer matrices", *International Journal of Mechanical Sciences*, 13 (1) (1971) 29-34.
10. Gladwell G. M. L., "The inverse mode problem for lumped-mass systems", *Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics*, 39 (2) (1986) 297-307.
11. Gladwell G. M. L., "Inverse finite element vibration problems", *Journal of Sound and Vibration*, 211 (2) (1999) 309-324.
12. Ghanbari K., "M-functions and inverse generalized eigenvalue problem", *Inverse problems*, 17 (2001) 211-217.
13. Ghanbari K., Parvizpour F., Mirzaei H., "Constructing Jacobi matrices using prescribed mixed eigendata", *Linear and Multilinear Algebra*, 62 (6) (2014) 721-734.
14. Aydin A., Guseinov G.sh., "Inverse spectral problem for finite Jacobi matrices with zero diagonal", *Linear and Multilinear Algebra*, 23 (8) (2015) 1267-1282.
15. Wei Y., "Inverse eigenvalue problem of Jacobi matrix with mixed data", *Linear Algebra and its Applications*, 466 (1) (2015) 102-116.
16. Peng Z. Y., Han X. L., "Constructing Jacobi matrices with prescribed ordered defective eigenpairs and a principal submatrix", *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 175 (2) (2005) 321-333.
17. Bai Y., Wei G., "A new inverse three spectral theorem for Jacobi matrices", *Linear Algebra and its Applications*, 493 (1) (2016) 301-312.
18. Nazari A. M., Mahdinasab F., "Inverse eigenvalue problem of distance matrix via orthogonal matrix", *Linear Algebra and its Applications*, 450 (1) (2014) 202-216.
19. Nazari A. M., Kamali Maher S., "On the nonnegative inverse eigenvalue problem of traditional matrices", *Journal of Linear and Topological Algebra*, 2 (3) (2013) 161-167.
20. Nazari A. M., Afshari E., "On the construction of symmetric nonnegative matrix with prescribed Ritz values", *Journal of Linear and Topological Algebra* 3 (2) (2014) 61-65.
21. Mirzaei H., "Inverse eigenvalue problem for pseudo-symmetric jacobi matrices with two spectra", *Linear and Multilinear Algebra*, 66 (4) (2018) 759-768.
22. Bebiano N., Fonseca C. M., Providencia J., "An inverse eigenvalue problem for periodic Jacobi matrices in Minkowski spaces", *Linear Algebra and its Applications*, 435 (1) (2011) 2033-2045.
23. Bebiano N., Providencia J., "Inverse eigenvalue problems for pseudo-Jacobi matrices: existence and uniqueness", *Inverse Problem*, 27 (2011) 1-12.