

## عدد تناوبی گراف‌ها

حسین حاجی ابوالحسن، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی،  
دانشگاه صنعتی دانمارک، دانشکده ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر، کپنهاگ، دانمارک  
میثم علیشاهی\*، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم ریاضی

پذیرش ۹۷/۰۵/۱۴

دریافت ۹۶/۰۴/۰۲

### چکیده

در سال ۲۰۱۵، حاجی ابوالحسن و علیشاهی عددهای تناوبی گراف‌ها را به‌عنوان یک کران پایین برای عدد رنگی گراف‌ها معرفی کردند. اثبات ارائه شده به‌وسیله آن‌ها مبتنی برلم تاکر (معادل ترکیبیاتی قضیه بورسوک-اولام) است که یک نتیجه در ترکیبیات توپولوژیکی است. در این مقاله یک اثبات کاملاً ترکیبیاتی برای این قضیه از علیشاهی و حاجی ابوالحسن ارائه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: گراف‌های کنسر، عدد رنگی، عدد تناوبی گراف‌ها

### مقدمه

در این مقاله، برای هر عدد طبیعی  $t$ ، مجموعه  $\{1, \dots, t\}$  را با نماد  $[t]$  نمایش می‌دهیم. یک ابرگراف  $\mathcal{H}$ ، یک زوج مرتب  $(V(\mathcal{H}), E(\mathcal{H}))$  است که در آن  $V(\mathcal{H})$  یک مجموعه متناهی است که اعضای آن رأس نامیده می‌شوند و  $E(\mathcal{H})$  خانواده‌ای از زیرمجموعه‌های ناتهی از  $V(\mathcal{H})$  است که به هر عضو آن یال می‌گوییم. یک  $t$ -رنگ‌آمیزی مجاز<sup>۱</sup> از یک ابرگراف  $\mathcal{H}$ ، یک تابع  $c: V(\mathcal{H}) \rightarrow [t]$  است که برای آن هیچ یالی از  $\mathcal{H}$  تک‌رنگ نیست (برای هر یال  $e \in E(\mathcal{H})$  داریم  $|c(e)| > 1$ ). به کم‌ترین مقدار ممکن برای چنین  $t$ -ای عدد رنگی  $\mathcal{H}$  می‌گوییم که آن را با  $\chi(\mathcal{H})$  نمایش می‌دهیم. در صورتی که ابرگراف  $\mathcal{H}$  دارای یالی از اندازه ۱ باشد عدد رنگی آن را بینهایت تعریف می‌کنیم.

برای یک بردار  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \{R, 0, B\}^n$ ، دنباله  $x_{a_1}, x_{a_2}, \dots, x_{a_l}$  ( $1 \leq a_1 < \dots < a_l \leq n$ ) که در آن  $x_{a_i}$ ‌ها دراپه‌هایی ناصفر از  $X$  هستند را متناوب می‌نامیم هرگاه هر دو عضو متوالی از این دنباله متفاوت باشند. به اندازه بزرگ‌ترین دنباله متناوب در  $X$  عدد تناوب  $X$  می‌گوییم و آن را با  $alt(X)$  نمایش می‌دهیم. هم‌چنین برای بردار  $X = (0, \dots, 0) \in \{R, 0, B\}^n$  مقدار  $alt(X)$  را برابر با صفر تعریف می‌کنیم. علاوه براین  $X^R$  و  $X^B$  را نیز به فرم زیر به  $X$  نسبت می‌دهیم:

$$X^R = \{i : x_i = R\} \text{ و } X^B = \{i : x_i = B\}.$$

برای مثال اگر  $X = (R, R, B, B, 0, R, 0, R, B)$  را در نظر بگیریم، آن‌گاه  $alt(X) = 4$ ،  $X^B = \{3, 4, 9\}$  و  $X^R = \{1, 2, 6, 8\}$  هم‌چنین توجه داشته باشید که با داشتن  $X^B$  و  $X^R$  می‌توان  $X$  را به‌طور یکتا تعیین کرد. لذا بردار  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  را می‌توان به‌صورت زوج مرتب  $X = (X^R, X^B)$  نیز نمایش داد. در طول این مقاله ما از هر دو نمایش بردار  $X$  به تناسب کاربرد آن‌ها استفاده خواهیم کرد. برای دو بردار  $X, Y \in \{R, 0, B\}^n$ ، گوییم  $X \subseteq Y$  هرگاه  $X^R \subseteq Y^R$  و  $X^B \subseteq Y^B$ . توجه کنید که اگر  $X \subseteq Y$  آن‌گاه هر دنباله متناوب از  $X$  یک دنباله متناوب از  $Y$  نیز هست، از این‌رو،  $alt(X) \leq alt(Y)$ . علاوه بر این با توجه به تعریف دنباله متناوب اولین درایه ناصفر از هر بردار غیرصفر  $X$  و اولین جمله هر دنباله متناوب با طول بیشینه از  $X$  همواره یکسان هستند. به‌عبارت دیگر، برای هر بردار غیرصفر  $X$ ، اولین جمله از هر دنباله متناوب با طول ماکسیمم برابر است با مقدار درایه متناظر با کوچک‌ترین عضو از  $X^R \cup X^B$ .

ابرگراف  $\mathcal{H} = (V, E)$  را در نظر بگیرید. قرار دهید  $\{v_{i_1} < v_{i_2} < \dots < v_{i_n} : (i_1, i_2, \dots, i_n) \in \mathcal{S}_n\}$  مجموعه همه ترتیب‌های خطی روی مجموعه  $V$  باشد. حال برای یک بردار  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \{R, 0, B\}^n$  و یک ترتیب خطی  $L_V = \{v_{i_1} < v_{i_2} < \dots < v_{i_n} \in L_V$  تعریف می‌کنیم

$$X_\sigma^R = \{v_{i_j} : x_j = R\}, X_\sigma^B = \{v_{i_j} : x_j = B\}, X_\sigma = (X_\sigma^R, X_\sigma^B).$$

توجه کنید که اگر  $V = [n]$  و  $I: 1 < \dots < n$ ، آن‌گاه  $X^R = X_I^R$ ،  $X^B = X_I^B$  و  $X = X_I$ . هم‌چنین زیرابگرافی از  $\mathcal{H}$  را که دارای مجموعه رأس‌های  $X_\sigma^R \cup X_\sigma^B$  و مجموعه یال‌های

$$E(\mathcal{H}_{X_\sigma}) = \{e \in E(\mathcal{H}) : e \subseteq X_\sigma^R \text{ or } e \subseteq X_\sigma^B\}$$

است را با  $\mathcal{H}_{X_\sigma}$  نمایش می‌دهیم.

### گراف‌های کنسری کلی

ابرگراف  $\mathcal{H} = (V, E)$  را در نظر بگیرید. گراف کنسر کلی  $KG(\mathcal{H})$  گرافی است با مجموعه رأس‌های  $E$  که در آن دو رأس  $e_1, e_2 \in E$  به یک‌دیگر متصل هستند هرگاه  $e_1 \cap e_2 = \emptyset$ . برای یک گراف داده شده  $G$ ، به هر ابرگراف  $\mathcal{H}$  که برای آن  $KG(\mathcal{H})$  و  $G$  یکریخت هستند یک نمایش کنسری  $\mathcal{H}$  از  $G$  گفته می‌شود. به سادگی می‌توان بررسی کرد که هر گراف  $G$  دارای تعداد نامتناهی نمایش کنسری است. برای اثبات کافی است ابرگراف  $\mathcal{H}$  را با مجموعه رأس‌های  $V(G) \cup E(\bar{G})$  در نظر بگیریم. متناظر با هر رأس  $v \in V(G)$  یال  $e_v$  را برابر با مجموعه همه یال‌هایی از  $\bar{G}$  که متصل به رأس  $v$  هستند به‌همراه خود رأس  $v$  تعریف می‌کنیم. نگاشت  $v \rightarrow e_v$  به‌وضوح یک یکریختی از  $G$  به  $KG(\mathcal{H})$  است، از این‌رو،  $KG(\mathcal{H})$  یک نمایش کنسری برای  $G$  است. حال تغییر دادن یال‌های  $\mathcal{H}$  با افزودن رأس‌های جدید به‌گونه‌ای که اشتراک و عدم اشتراک‌ها در بین یال‌های  $\mathcal{H}$  ثابت بمانند، باعث ساختن یک نمایش کنسری جدید برای  $G$  خواهد شد. بدیهی است که این کار به نامتناهی روش قابل انجام است.

## عدد تناوبی ابرگرافها

برای ابرگراف داده شده  $\mathcal{H} = (V, E)$ ، یک ترتیب خطی  $\sigma \in L_V$  و عدد طبیعی  $k$  را در نظر بگیرید.  $k$ -امین عدد  $\sigma$ -تناوبی  $\mathcal{H}$  را که با  $alt_\sigma(\mathcal{H}, k)$  نمایش می‌دهیم برابر با بزرگ‌ترین مقدار ممکن از  $t$  تعریف می‌کنیم که برای آن لاقل یک  $X \in \{R, 0, B\}^n$  وجود دارد که  $alt(X) = t$  و همچنین عدد رنگی ابرگراف  $(\mathcal{H}_{1X_\sigma})$  حداکثر برابر  $k-1$  است. در حالت  $k=1$  این بدان معنی است که ابرگراف  $\mathcal{H}_{1X_\sigma}$  دارای هیچ یالی نیست. حال عدد تناوب  $k$ -ام ابرگراف  $\mathcal{H}^1$  را بدین صورت معرفی می‌کنیم:

$$alt(\mathcal{H}, k) = \min \{ alt_\sigma(\mathcal{H}, k) : \sigma \in L_V \}.$$

اکنون یک گراف دلخواه  $G$  و یک عدد صحیح  $k$  را که  $1 \leq k \leq \chi(G) + 1$  در نظر بگیرید.  $k$ -امین عدد تناوبی  $G$  را بدین صورت معرفی می‌کنیم:

$$\zeta(G, k) = \max_{\mathcal{H}} \{ |V(\mathcal{H})| - alt(\mathcal{H}, k) + k - 1 : \text{KG}(\mathcal{H}) \longleftrightarrow G \}$$

که در آن  $\text{KG}(\mathcal{H}) \longleftrightarrow G$  بدین معنی است که لاقل یک همریختی از  $\text{KG}(\mathcal{H})$  به  $G$  و لاقل یک همریختی از  $G$  به  $\text{KG}(\mathcal{H})$  وجود دارد. دقت کنید که اگر  $k = \chi(G) + 1$ ، آن‌گاه برای هر ابرگراف  $\mathcal{H}$  که  $\text{KG}(\mathcal{H}) \longleftrightarrow G$  داریم  $k = \chi(\text{KG}(\mathcal{H})) + 1$ ، از این رو  $|alt(\mathcal{H}, k)| = |V(\mathcal{H})|$ . هرچند که با توجه به تعریف مقدار  $\zeta(G, k)$  ممکن است نامتناه‌ی باشد، در خلال اثبات قضیه ۱ می‌بینیم که همواره  $\zeta(G, k)$  عددی متناهی است.

در مقاله [۱] با استفاده از لم تاکر<sup>۲</sup> که یک معادل ترکیببایستی برای قضیه معروف بورسوک-اولام<sup>۳</sup> است، حاجی‌ابوالحسن و علیشاهی نشان دادند که برای هر گراف  $G$  و هر عدد صحیح  $k$  که  $1 \leq k \leq \chi(G) + 1$ ، همواره  $k$ -امین عدد تناوبی  $G$  یک کران پایین برای عدد رنگی  $G$  ارائه می‌دهد.

**قضیه ۱.** [۱] برای هر گراف  $G$  و هر عدد صحیح  $k$  که  $1 \leq k \leq \chi(G) + 1$  داریم  $\chi(G) \geq \zeta(G, k)$ . در [۱] برای حالت  $k=1$  نشان داده شده است که قضیه مذکور یک بهبود از قضیه مشهور دولنیکوف [۴] است. همچنین در [۱]، [۲] عدد رنگی بعضی از خانواده‌های گرافها به کمک این کران پایین محاسبه شده‌اند. علاوه بر این علیشاهی و حاجی‌ابوالحسن به کمک یک تعمیم از لم گیل<sup>۴</sup> نشان دادند که اولین عدد تناوبی، یک کران پایین دقیق<sup>۵</sup> برای بعضی از کران‌های پایین توپولوژیکی برای عدد رنگی گرافها است [۳]. برای بررسی بیش‌تر می‌توانید به [۳] مراجعه کنید. میونیر اثبات کرد که محاسبه اولین عدد تناوبی گرافها یک مسئله سخت است [۱۰]. در حقیقت او نشان داد که برای یک ابرگراف داده شده  $\mathcal{H}$  و یک ترتیب خطی  $\sigma$ ، به‌دست آوردن  $alt_\sigma(\mathcal{H}, 1)$  یک مسئله NP-سخت است.

1.  $k$ -th alternation number  
2. Tucker lemma  
3. Borsuk-Ulam Theorem  
4. Gale lemma  
5. Sharp

## اثبات ترکیبیاتی برای قضیه ۱

برای دو عدد  $m$  و  $n$  که  $m \geq 2n$ ، گراف کنسر معمولی<sup>۱</sup>  $KG(m, n)$  گرافی است با مجموعه رأس‌های متشکل از همه زیرمجموعه‌های  $k$ -عضوی از  $[m]$  که در آن دو رأس به یکدیگر متصل هستند اگر و تنها اگر اشتراک آن‌ها تهی باشد. کنسر در سال ۱۹۵۵ [5] حدس زد که  $\chi(KG(m, n)) = m - 2n + 2$ . در حقیقت او یک رنگ‌آمیزی مجاز برای  $KG(m, n)$  با  $m - 2n + 2$  رنگ ارائه داد. این حدس در سال ۱۹۷۸ به وسیله لواز [۷] و به کمک ابزارهای توپولوژیکی به اثبات رسید. مقاله لواز به‌عنوان سرآغاز بررسی ترکیبیات به‌کمک ابزارهای توپولوژیکی باعث تولد شاخه‌ای از ترکیبیات شد که امروزه به‌عنوان ترکیبیات توپولوژیکی<sup>۲</sup> شناخته می‌شود. اسکرایور [۱۱] زیرگرافی از گراف کنسر  $KG(m, n)$  را معرفی کرد که نه تنها دارای عدد رنگی یکسانی با  $KG(m, n)$  است بلکه یک گراف رأس بحرانی نیز هست. این زیرگراف را با  $SG(m, n)$  نمایش می‌دهیم. در [۱] ثابت شده است که قضیه ۱ به سادگی نتایج لواز و اسکرایور را نتیجه می‌دهد. در ادامه این بخش یک اثبات کاملاً ترکیبیاتی برای قضیه ۱ ارائه می‌دهیم. لازم به ذکر است که ایده این اثبات مبتنی بر اثباتی ترکیبیاتی از قضیه لواز است که برای اولین بار به وسیله متوسک در [۹] ارائه شده است.

اثبات قضیه ۱. فرض کنید حکم قضیه برقرار نباشد و داشته باشیم  $\zeta(G, k) > \chi(G)$ . ابرگراف  $\mathcal{H}$  را چنان در نظر بگیرید که  $KG(\mathcal{H})$  و  $G$  هم‌ریخت باشند و هم‌چنین داشته باشیم:

$$\zeta(G, k) \geq |V(\mathcal{H})| - \text{alt}(\mathcal{H}, k) + k - 1 = |V(\mathcal{H})| - \text{alt}_\sigma(\mathcal{H}, k) + k - 1 > \chi(G)$$

که در آن  $\sigma \in L_{V(\mathcal{H})}$ . توجه کنید که بدون کاستن از کلیت و برای سادگی در نوشتن می‌توانیم فرض کنیم که  $V(\mathcal{H}) = [n]$  و  $\sigma = I: 1 < \dots < n$ . یک رنگ‌آمیزی مجاز

$$h: V(KG(\mathcal{H})) = E(\mathcal{H}) \longrightarrow \{1, \dots, n - \text{alt}(\mathcal{H}, k) + k - 2\}$$

از  $KG(\mathcal{H})$  را در نظر بگیرید. برای هر زیرمجموعه  $M \subseteq V(\mathcal{H})$  تعریف می‌کنیم  $\bar{h}(M) = \max\{h(e) : e \subseteq M, e \in E(\mathcal{H})\}$  اگر  $e \in E(\mathcal{H})$  وجود نداشت که  $e \subseteq M$ ، آن‌گاه قرار می‌دهیم  $\bar{h}(M) = 0$ . حال برای هر بردار  $X = (X^R, X^B) \in \{R, 0, B\}^n$  قرار می‌دهیم  $\bar{h}(X) = \max\{\bar{h}(X^R), \bar{h}(X^B)\}$  اکنون نگاشت  $\lambda: \{R, 0, B\}^n \longrightarrow \{\pm 1, \dots, \pm n\}$  را بدین صورت تعریف می‌کنیم.

۱. اگر  $X = (X^R, X^B) \in \{R, 0, B\}^n$  و  $\text{alt}(X) \leq \text{alt}_I(\mathcal{H}, k)$ ، آن‌گاه

$$\lambda(X) = \begin{cases} +\text{alt}(X) + 1 & \text{if } X^B = \emptyset \text{ or } \min(X^R \cup X^B) \in X^R \\ -\text{alt}(X) - 1 & \text{otherwise} \end{cases}$$

۲. اگر  $X = (X^R, X^B) \in \{R, 0, B\}^n$  و  $\text{alt}(X) \geq \text{alt}_I(\mathcal{H}, k) + 1$ ، آن‌گاه

1. Usual Kneser graph  
2. Topological Combinatorics

$$\lambda(X) = \begin{cases} alt_1(\mathcal{H}, k) + \bar{h}(X) - k + 2 & \text{if } \bar{h}(X) = \bar{h}(X^R) \\ -(alt_1(\mathcal{H}, k) + \bar{h}(X) - k + 2) & \text{if } \bar{h}(X) = \bar{h}(X^B) \end{cases}$$

از آن‌جا که  $h$  یک رنگ‌آمیزی مجاز است می‌توان به سادگی بررسی کرد که نگاشت  $\lambda$  تعریف شده در بالا خوش‌تعریف است. خوش‌تعریفی نگاشت  $\lambda$  در حالت ۱ کاملاً بدیهی است. از این‌رو، کافی است نشان دهیم که در حالت ۲، برای هر  $X$  دلخواه، تنها یکی از دو حالت  $\bar{h}(X) = \bar{h}(X^R)$  یا  $\bar{h}(X) = \bar{h}(X^B)$  می‌تواند رخ دهد. در غیر این‌صورت، با توجه به تعریف  $\bar{h}(X)$ ، باید  $\bar{h}(X^R) = \bar{h}(X^B)$  و لذا دو رأس  $A$  و  $B$  از گراف  $KG(\mathcal{H})$  چنان وجود دارند که  $A \subseteq X^R$ ،  $B \subseteq X^B$ ، و  $h(A) = h(B)$ . از طرفی  $X^R \cap X^B = \emptyset$  نتیجه می‌دهد که  $A \cap B = \emptyset$  و لذا  $A$  به  $B$  در  $KG(\mathcal{H})$  متصل است که این با مجاز بودن رنگ‌آمیزی  $h$  در تناقض است.

هم‌چنین به سادگی می‌توان دید که برای هر  $(A, B) \subseteq (A', B')$  داریم  $\lambda(A, B) + \lambda(A', B') \neq 0$ . برای اثبات فرض کنید که  $(A, B) \subseteq (A', B')$  چنان وجود دارند که  $\lambda(A, B) = -\lambda(A', B') = \ell$ . در ابتدا، با توجه به تعریف  $\lambda$ ، توجه کنید برای  $X = (A, B)$  و  $Y = (A', B')$ ، یا هر دو در حالت ۱ و یا هر دو در حالت ۲ از تعریف  $\lambda$  صدق می‌کنند. اگر  $X$  و  $Y$  هر دو در حالت ۱ از تعریف صدق کنند در این صورت  $alt(X) = alt(Y) = \ell - 1$  و اولین درایه‌های ناصفر در  $X$  و  $Y$  به ترتیب باید  $R$  و  $B$  باشند. ولی از آن‌جا که  $X \subseteq Y$ ، این نتیجه می‌دهد که  $alt(X) < alt(Y)$  و این امکان‌پذیر نیست. حال فرض کنید که  $X$  و  $Y$  هر دو در حالت ۲ از تعریف  $\lambda$  صدق کنند. لذا باید داشته باشیم

$$\bar{h}(X) = \bar{h}(X^R) = \ell - alt_1(\mathcal{H}, k) + k - 2 = c$$

و

$$\bar{h}(Y) = \bar{h}(Y^B) = \ell - alt_1(\mathcal{H}, k) + k - 2 = c.$$

بنابراین دو رأس  $A$  و  $B$  از  $KG(\mathcal{H})$  چنان وجود دارند که  $A \subseteq X^R$ ،  $B \subseteq X^B$ ، و  $h(A) = h(B) = c$ . از طرفی چون  $A \subseteq X^R \subseteq Y^R$ ،  $B \subseteq Y^B$ ، و  $Y^R \cap Y^B = \emptyset$  دو رأس  $A$  و  $B$  در  $KG(\mathcal{H})$  متصل هستند که این در تناقض با مجاز بودن رنگ‌آمیزی  $h$  است. هم‌چنین با توجه به تعریف  $alt_1(\mathcal{H}, k)$ ، اگر  $alt(X) \geq alt_1(\mathcal{H}, k) + 1$ ، آن‌گاه عدد رنگی گراف  $KG(\mathcal{H}_k)$  حداقل  $k$  خواهد بود، از این‌رو،  $\lambda((\emptyset, \emptyset)) = 1$ . از طرفی بنابر تعریف تابع  $\lambda$  واضح است که  $\lambda(X) \geq alt_1(\mathcal{H}, k) + 2$ .

در ادامه گراف ساده و متناهی  $H$  را به‌گونه‌ای می‌سازیم که این گراف دارای تنها یک رأس از درجه ۱ است در حالی که سایر رأس‌های آن همگی از درجه ۲ هستند. از آن‌جا که مجموع درجه رأس‌های هر گراف عددی زوج است، واضح است که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست، از این‌رو، این تناقض باعث تکمیل اثبات می‌شود.

برای هر زیرمجموعه  $A \subseteq [n]$  تعریف می‌کنیم  $-A = \{-t : t \in A\}$ . توجه کنید که اگر  $A = \emptyset$ ، آن‌گاه  $-A = \emptyset$ . یک دنباله مجاز یک دنباله  $(A_0, B_0) \subseteq (A_1, B_1) \subseteq \dots \subseteq (A_m, B_m)$  از اعضای  $\{R, 0, B\}^n$  است به‌طوری‌که برای هر  $0 \leq i \leq m$  داریم  $|A_i| + |B_i| = i$  و هم‌چنین

$$A_m \cup -B_m \subseteq \{\lambda((A_0, B_0)), \lambda((A_1, B_1)), \dots, \lambda((A_m, B_m))\}.$$

توجه کنید که همواره  $A_0 = B_0 = \emptyset$  و  $0 \leq m \leq n$ . همچنین مجاز بودن دنباله  $(\emptyset, \emptyset)$  نتیجه مستقیم تعریف دنباله مجاز است.

مجموعه رأس‌های گراف  $H$  را مجموعه همه دنباله‌های مجاز تعریف می‌کنیم. حال به تعریف یال‌های این گراف می‌پردازیم. برای دنباله مجاز  $(\emptyset, \emptyset)$  همسایه یکتای آن را دنباله مجاز  $(\{1\}, \emptyset) \subseteq (\emptyset, \emptyset)$  تعریف می‌کنیم. برای هر دنباله مجاز دیگر، دو همسایه آن را بدین صورت تعریف می‌کنیم.

یک دنباله مجاز  $(A_0, B_0) \subseteq (A_1, B_1) \subseteq \dots \subseteq (A_m, B_m)$  را که  $m \geq 1$  در نظر بگیرید. برای هر  $0 \leq i \leq m$  قرار دهید  $\lambda_i = \lambda(A_i, B_i)$ . با توجه به تعریف نگاشت  $\lambda$  واضح است که اگر  $(A, B) \subseteq (A', B')$ ، آن‌گاه  $|\lambda(A, B)| \leq |\lambda(A', B')|$ . با توجه به رابطه

$$A_m \cup -B_m \subseteq \{\lambda((A_0, B_0)), \lambda((A_1, B_1)), \dots, \lambda((A_m, B_m))\}$$

و از آن‌جا که  $|A_m \cup -B_m| = m$ ، مجموعه  $\{\lambda((A_0, B_0)), \lambda((A_1, B_1)), \dots, \lambda((A_m, B_m))\}$  دارای  $m$  و یا  $m+1$  عضو است. بنابراین یکی از این دو حالت رخ می‌دهد.

۱. اندیس یکتای  $i$  چنان وجود دارد که  $0 \leq i < m$  و  $\lambda_i = \lambda_{i+1}$ .

۲. اندیس یکتای  $i$  چنان وجود دارد که  $0 \leq i \leq m$  و  $\lambda_i \notin A_m \cup -B_m$ .

ابتدا حالت اول را در نظر می‌گیریم. توجه کنید که در این حالت  $i=0$  امکان‌پذیر نیست، زیرا با توجه به تعریف نگاشت  $\lambda$ ، برای هر  $j > 0$  داریم  $|\lambda_j| > 1$ . حال اگر  $\lambda_i = \lambda_{i+1}$  برای یک  $1 \leq i < m$ ، دو همسایه دنباله  $S = (A_0, B_0) \subseteq (A_1, B_1) \subseteq \dots \subseteq (A_m, B_m)$  بدین صورت تعریف می‌شوند:

الف) اولین همسایه دنباله  $S$  دنباله  $(A'_0, B'_0) \subseteq (A'_1, B'_1) \subseteq \dots \subseteq (A'_m, B'_m)$  است که در آن  $(A'_r, B'_r) = (A_r, B_r)$  داریم  $r \neq i$  و برای هر  $(A'_i, B'_i) = (A_{i-1} \cup (A_{i+1} \setminus A_i), B_{i-1} \cup (B_{i+1} \setminus B_i))$

ب) اگر  $i < m-1$ ، آن‌گاه  $(A''_0, B''_0) \subseteq (A''_1, B''_1) \subseteq \dots \subseteq (A''_m, B''_m)$  همسایه دیگر دنباله مجاز  $S$  است که

$(A''_{i+1}, B''_{i+1}) = (A_i \cup (A_{i+2} \setminus A_{i+1}), B_i \cup (B_{i+2} \setminus B_{i+1}))$  و برای هر  $r \neq i+1$  نیز داریم

$(A''_r, B''_r) = (A_r, B_r)$ . در غیر این صورت اگر  $i = m-1$ ، آن‌گاه همسایه دیگر دنباله مجاز  $S$  برابر دنباله

$(A_{m-1}, B_{m-1}) \subseteq (A_m, B_m)$  تعریف می‌شود.

حال حالت دوم را در نظر می‌گیریم. یعنی اندیس یکتای  $i$  چنان وجود دارد که  $0 \leq i \leq m$  و  $\lambda_i \notin A_m \cup -B_m$ .

در این حالت دو همسایه  $S = (A_0, B_0) \subseteq (A_1, B_1) \subseteq \dots \subseteq (A_m, B_m)$  را بدین صورت تعریف می‌کنیم:

الف) اولین همسایه دنباله  $S$  دنباله  $(A'_0, B'_0) \subseteq (A'_1, B'_1) \subseteq \dots \subseteq (A'_m, B'_m) \subseteq (A'_{m+1}, B'_{m+1})$  است که در آن

برای هر  $0 \leq r \leq m$  داریم  $(A'_r, B'_r) = (A_r, B_r)$ . اگر  $\lambda_i > 0$ ، آن‌گاه  $(A'_{m+1}, B'_{m+1}) = (A_m \cup \{\lambda_i\}, B_m)$

و در غیر این صورت  $(A'_{m+1}, B'_{m+1}) = (A_m, B_m \cup \{-\lambda_i\})$ .

(ب) اگر  $1 \leq i \leq m-1$ ، آن‌گاه همسایه دیگر دنباله  $\mathcal{S}$  را دنباله  $(A_0'', B_0'') \subseteq (A_1'', B_1'') \subseteq \dots \subseteq (A_m'', B_m'')$  تعریف می‌کنیم که

$$(A_i'', B_i'') = (A_{i-1} \cup (A_{i+1} \setminus A_i), B_{i-1} \cup (B_{i+1} \setminus B_i))$$

و برای هر  $r \neq i$  داریم  $(A_r'', B_r'') = (A_r, B_r)$ . اما اگر  $i = m$ ، آن‌گاه همسایه دوم را برابر دنباله

$$(A_0, B_0) \subseteq (A_1, B_1) \subseteq \dots \subseteq (A_{m-1}, B_{m-1})$$

قرار می‌دهیم. در نهایت برای حالت  $i = 0$ ، همسایه دوم را دنباله  $(B_0, A_0) \subseteq (B_1, A_1) \subseteq \dots \subseteq (B_m, A_m)$  تعیین می‌کنیم.

مجاز بودن دنباله‌های معرفی شده در دو قسمت مذکور به سادگی قابل بررسی است. همچنین می‌توان مشاهده کرد که تعاریف همسایگی‌ها به صورت متقارن هستند، از این‌رو، گراف  $H$  حاصل شده یک گراف ساده با شرایط ادعا شده است که منجر به تکمیل اثبات می‌شود.

### منابع

1. Alishahi M., Hajiabolhassan H., "On the chromatic number of general Kneser hypergraphs", *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 115 (2015) 186-209.
2. Alishahi M., Hajiabolhassan H., "Altermatic number of categorical products of graphs", *Discrete Mathematics*, 341 (2018) 1316-1324.
3. Alishahi M., Hajiabolhassan H., "A Generalization of Gale's lemma", *Journal of Graph Theory*, 88(2) (2018) 337-346.
4. Dol'nikov V. L., "A combinatorial inequality", *Sibirsk. Mat. Zh.*, 29 (3) 219 (1988) 53-58.
5. Kneser M., "Satz über abelsche Gruppen mit Anwendungen auf die Geometrie der Zahlen", *Math. Z.*, 61 (1955) 429-434.
6. Kříž I., "Equivariant cohomology and lower bounds for chromatic numbers", *Trans. Amer. Math. Soc.*, 333(2) (1992) 567-577.
7. Lovász L., "Kneser's conjecture, chromatic number, and homotopy", *Journal of Combinatorial Theory, Series A*, 25(3) (1978) 319-324.
8. Matoušek J., "Using the Borsuk-Ulam theorem", *Universitext. Springer-Verlag, Berlin, Lectures on topological methods in combinatorics and geometry, Written in cooperation with Anders Björner and Günter M. Ziegler* (2003).
9. Matoušek J., "A combinatorial proof of Kneser's conjecture", *Combinatorica*, 24(1) (2004) 163-170.

10. Meunier F., "Colorful Subhypergraphs in Kneser Hypergraphs", *Electronic Journal of Combinatorics*, 21(1): Research Paper #P1.8 (2014) 13 (electronic).
11. Schrijver A., "Vertex-critical subgraphs of Kneser graphs", *Nieuw Arch. Wisk.* (3) 26 (3) (1978) 454-461.