

مشخصه‌سازی شبه n -هم‌ریختی‌های ژوردان بین جبرهای یکدار

عباس زیوری کاظم پور*

دانشگاه ایت ا... بروجردی، گروه ریاضی، بروجرد، ایران

اباصلت بداغی

گروه ریاضی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

پذیرش ۹۸/۰۴/۰۴

دریافت ۹۶/۱۲/۲۸

چکیده

فرض کنید A و B دو جبر باناخ و B یک A -مدول راست باشد. در این مقاله تحت شرایط خاص ثابت می‌کنیم که هر شبه $(n+1)$ -هم‌ریختی ژوردان $f: A \rightarrow B$ یک شبه n -هم‌ریختی ژوردان است و هر شبه n -هم‌ریختی ژوردان یک n -هم‌ریختی ژوردان است.
واژه‌های کلیدی: n -هم‌ریختی، n -هم‌ریختی ژوردان، شبه n -هم‌ریختی ژوردان.

مقدمه

فرض کنید A و B جبرهای باناخ مختلط و $f: A \rightarrow B$ یک تابع خطی باشد. در این صورت f یک n -هم‌ریختی نامیده می‌شود اگر برای هر $a_1, a_2, \dots, a_n \in A$

$$f(a_1 a_2 \dots a_n) = f(a_1) f(a_2) \dots f(a_n).$$

مفهوم n -هم‌ریختی برای جبرهای مختلط به‌وسیلهٔ حجازیان^۱ و همکاران معرفی شد [۴] [۹] (نیز ملاحظه شود) هرشتاین^۲ مفهوم n -هم‌ریختی ژوردان را بررسی کرد [۱۰]. تابع خطی f بین جبرهای باناخ A و B یک n -هم‌ریختی ژوردان نامیده می‌شود اگر برای هر $a \in A$

$$f(a^n) = f(a)^n.$$

یک 2 -هم‌ریختی (2 -هم‌ریختی ژوردان) به‌طور ساده یک هم‌ریختی (هم‌ریختی ژوردان) نامیده می‌شود. واضح است که هر n -هم‌ریختی یک n -هم‌ریختی ژوردان است، ولی در حالت کلی، عکس این مطلب نادرست است. مثال‌هایی از n -هم‌ریختی ژوردان وجود دارد که n -هم‌ریختی نیست. برای حالت $n=2$ ، ثابت شده است که برخی هم‌ریختی ژوردان روی حلقه چندجمله‌ای‌ها نمی‌تواند یک هم‌ریختی باشد [۱۱]. در [۶] برای حالتی که $n \in \{2, 3, 4\}$ نشان داده شده که هر n -هم‌ریختی ژوردان بین دو جبر باناخ جابه‌جایی یک n -هم‌ریختی است و این نتیجه برای حالت $n=5$ در [۷] گسترش داده شد. در حالتی که n یک عدد طبیعی دلخواه باشد، در [۸] و

*نویسنده مسئول zivari6526@gmail.com

1. Hejazian
2. Herstein

[۱۲] این نتیجه تعمیم داده شد. به علاوه این خاصیت در [۲] نیز با یک روش متفاوت که در [۸] و [۱۲] به کار رفته بود، اثبات شده است.

یادآوری می‌کنیم که جبر A نیم‌ساده است هرگاه رادیکال جاکوبسون A ، که اشتراک همه ایده‌آل‌های چپ مدولار ماکسیمال A است، بدیهی باشد، به عبارت دیگر $\text{Rad}(A) = \{0\}$. زلازکو^۱ یک مشخصه‌سازی از هم‌ریختی ژوردان را ارائه کرد [۱۶]، که در زیر به آن اشاره می‌کنیم [۱۴] نیز مشاهده شود.

قضیه ۱. فرض کنید A یک جبر باناخ باشد که لزوماً جابه‌جایی نیست و B یک جبر باناخ جابه‌جایی یکدار و نیم‌ساده باشد. در این صورت هر هم‌ریختی ژوردان $f: A \rightarrow B$ یک هم‌ریختی است.

نتیجه مذکور برای ۳-هم‌ریختی ژوردان با شرط اضافی یکدار بودن A در [۱۷] و سپس برای n -هم‌ریختی ژوردان که n یک عدد طبیعی دلخواه است، با همان شرط در [۱] به اثبات رسید. همچنین برای هر $n \in \{3, 4\}$ این قضیه بدون شرط یکدار بودن A و با شرط اضافی زیر در [۳] ثابت شد.

$$f(ab^2) = f(b^2a), \quad (a, b \in A).$$

بعضی نتایج قابل توجه و مهم در مورد هم‌ریختی ژوردان و پیوستگی خودکار آنها روی جبرهای باناخ در [۱۷]، [۱۸] و [۱۹] قابل دسترسی هستند.

عبادیان و دیگران مفهوم کلی‌تری از n -هم‌ریختی ژوردان، یعنی شبه n -هم‌ریختی ژوردان را معرفی کردند [۵]. فرض کنید A و B دو جبر و A یک مدول راست باشد. تابع خطی $f: A \rightarrow B$ یک شبه n -هم‌ریختی ژوردان نامیده می‌شود اگر یک $w \in A$ موجود باشد به طوری که برای هر $a \in A$

$$f(a^n w) = f(a)^n \cdot w.$$

در چنین حالتی، w را ضریب ژوردان تابع f می‌نامیم.

قابل ذکر است که قسمت (۳) از مثال ۲.۲ از [۵] اشکال مختصری دارد که بدین صورت اصلاح می‌کنیم:

فرض کنید:

$$U_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

زیرجبری از جبر ماتریس‌های 2×2 با جمع و ضرب معمولی ماتریس‌ها باشد. تابع خطی $f: U_2(\mathbb{R}) \rightarrow U_2(\mathbb{R})$

را با ضابطه $f\left(\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ تعریف می‌کنیم. در این صورت f یک n -هم‌ریختی ژوردان نیست. فرض کنید

$s, t \in \mathbb{R}$ دلخواه باشند. قرار می‌دهیم، $w = \begin{bmatrix} s & t \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. در این صورت برای هر $n \in \mathbb{N}$ داریم:

$$f\left(\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix}^n w\right) = f\left(\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix}\right)^n w.$$

بنابراین f یک شبه n -هم‌ریختی ژوردان است. این مثال نشان می‌دهد که دسته n -هم‌ریختی‌های ژوردان و شبه n -هم‌ریختی‌های ژوردان با هم متفاوتند.

واضح است که هر n -هم‌ریختی ژوردان از جبر یکدار A بتوی یک باناخ A -مدول یکدار B یک شبه n -هم‌ریختی ژوردان است. همچنین چنان‌که در مثال بالا نشان داده شد برای یک شبه n -هم‌ریختی ژوردان می‌توان تعداد نامتناهی ضریب ژوردان در نظر گرفت.

در [۵] قضیه ۲.۳، تحت شرایطی ثابت شده است که هر شبه n -همریختی ژوردان $f: A \rightarrow B$ یک شبه $(n+1)$ -همریختی ژوردان است. در این مقاله تحت فرضیات خاصی عکس این قضیه را ثابت می‌کنیم. همچنین نشان می‌دهیم که هر شبه همریختی ژوردان $f: A \rightarrow B$ یک شبه n -همریختی ژوردان است. در سرتاسر این مقاله فرض کنید A و B دو جبر باناخ یکدار و B یک A -مدول راست باشد. نگاشت $f: A \rightarrow B$ را یکانی می‌نامیم هرگاه $f(e_1) = e_2$ که در آن e_1 و e_2 به ترتیب واحدهای A و B می‌باشند.

شبه n -همریختی ژوردان

این بخش را با قضیه زیر شروع می‌کنیم که عکس قضیه ۲.۳ از [۵] است.
قضیه ۲. هر شبه $(n+1)$ -همریختی ژوردان یکانی $f: A \rightarrow B$ با ضریب ژوردان w یک شبه n -همریختی ژوردان است.

برهان: بنابه فرض برای هر $a \in A$ ،

$$f((a + ke)^{n+1}w) = f(a + ke)^{n+1}.w. \quad (۱)$$

که در آن k یک عدد طبیعی است به طوری که $1 \leq k \leq n$. از رابطه (۱) نتیجه می‌شود که

$$\sum_{i=1}^n k^{n+1-i} \binom{n+1}{i} [(f(a^i w) - f(a)^i . w)] = 0, \quad (۲)$$

برای هر $a \in A$ ، که در آن $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. به کمک رابطه (۲)، برای هر $a \in A$ داریم:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 2^n & 2^{n-1} & \dots & 2^2 & 2 \\ 3^n & 3^{n-1} & \dots & 3^2 & 3 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n^n & n^{n-1} & \dots & n^2 & n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_1(a, w) \\ L_2(a, w) \\ L_3(a, w) \\ \vdots \\ L_n(a, w) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix},$$

که در آن برای هر $1 \leq i \leq n$ ،

$$L_i(a, w) = \binom{n+1}{i} [(f(a^i w) - f(a)^i . w)].$$

بنابه لم ۲.۱ از [۲]، ماتریس مربعی فوق، که ماتریس واندرموند است، وارون پذیر است. از این رو، برای هر $a \in A$ و هر $1 \leq i \leq n$

$$L_i(a, w) = 0.$$

به ویژه $L_n(a, w) = 0$ یعنی

$$f(a^n w) = f(a)^n . w.$$

بنابراین f یک شبه n -همریختی ژوردان است.

نتیجه مستقیم از قضیه ۲، بدین صورت است:

نتیجه ۳. هر $(n+1)$ -همریختی ژوردان یکانی $f: A \rightarrow B$ یک n -همریختی ژوردان است.

مثال ۴ نشان می‌دهد که شرط یکدار بودن جبرهای A و B در نتیجه ۳ الزامی است. به علاوه در این مثال، f شبه همریختی ژوردان هست ولی همریختی ژوردان نیست.

مثال ۴. فرض کنید

$$A = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

زیر جبری از جبر ماتریس‌های 3×3 باشد. تابع خطی $f: A \rightarrow A$ را با این ضابطه تعریف می‌کنیم:

$$f\left(\begin{bmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

در این صورت برای هر $x \in A$ که ac متناظر با آن صفر نباشد، $f(x^2) \neq f(x)^2$. بنابراین f یک هم‌ریختی ژوردان نیست، ولی برای هر $n \geq 3$ و هر $x \in A$ داریم، $f(x^n) = f(x)^n$. از این‌رو، برای $n \geq 3$ یک

n -هم‌ریختی ژوردان است. فرض کنید $s, t, r \in \mathbb{R}$ دلخواه باشند. قرار می‌دهیم، $w = \begin{bmatrix} 0 & s & t \\ 0 & 0 & r \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. در این صورت

برای هر $n \in \mathbb{N}$ که $n \geq 2$ باشد، داریم $f(x^n w) = f(x)^n w$ یعنی f یک شبه n -هم‌ریختی ژوردان است. با توجه به استدلال قضیه ۲، چون به‌ازای هر i ($1 \leq i \leq n$) داریم $L_i(a, w) = 0$ ، از این‌رو، نتیجه بعدی حاصل می‌شود:

نتیجه ۵. فرض کنید $f: A \rightarrow B$ یک شبه n -هم‌ریختی ژوردان یکانی با ضریب ژوردان w باشد. در این صورت برای هر $a \in A$ و $(1 \leq i \leq n)$ ،

$$f(a^i w) = f(a)^i . w.$$

بنابراین اگر f یک شبه هم‌ریختی ژوردان با ضریب ژوردان w باشد آن‌گاه برای هر $a \in A$ ،

$$f(aw) = f(a) . w.$$

یادآوری می‌کنیم که هر هم‌ریختی ژوردان یک n -هم‌ریختی ژوردان است (برای اثبات به لم ۳.۲ از [۱۵])

مراجعه شود). مثال بعد نشان می‌دهد که این مطلب برای شبه هم‌ریختی ژوردان با ضریب ژوردان w درست نیست.

مثال ۶. فرض کنید A یک جبر باناخ و $h: A \rightarrow A$ یک هم‌ریختی بدون نقطه ثابت باشد. تابع $f: A \rightarrow A$ را با ضابطه $f(x) := -h(x)$ تعریف می‌کنیم. در این صورت f یک ۳-هم‌ریختی است. فرض کنید f دارای نقطه ثابت w باشد، از این‌رو، $f(w) = w$. بنابراین

$$f(x^2 w) = f(x)^2 f(w) = f(x)^2 w.$$

در نتیجه f یک شبه هم‌ریختی ژوردان با ضریب ژوردان w است، ولی f یک شبه ۳-هم‌ریختی ژوردان با ضریب ژوردان w نیست. قابل ذکر است که f یک شبه ۳-هم‌ریختی ژوردان با ضریب ژوردان w^2 است.

در قضیه ۷ تحت شرایط خاصی نشان می‌دهیم که هر شبه هم‌ریختی ژوردان یک شبه n -هم‌ریختی ژوردان است. برای اثبات، ابتدا تعریف نقطه جداساز را از [۱۳] یادآوری می‌کنیم. فرض کنید A یک جبر باناخ و M یک A -مدول باشد. در این صورت عضو $w \in A$ را یک نقطه جداساز چپ (راست) برای M می‌نامیم هرگاه برای هر $x \in M$ ، شرط $w x = 0$ ($x w = 0$) نتیجه دهد که $x = 0$.

قضیه ۷. فرض کنید $f: A \rightarrow B$ یک شبه هم‌ریختی ژوردان یکانی با ضریب ژوردان w باشد به‌طوری‌که w یک نقطه جداساز راست برای B است. در این صورت f یک هم‌ریختی ژوردان است و در نتیجه

الف) f یک n -همریختی ژوردان است.

ب) f یک شبه n -همریختی ژوردان با همان ضریب ژوردان w است.

برهان: فرض کنید $f: A \rightarrow B$ یک شبه همریختی ژوردان یکانی باشد. در این صورت برای هر $a \in A$

$$f(a^2w) = f(a)^2 \cdot w. \quad (۳)$$

با جای‌گذاری $a + b$ به جای a در رابطه (۳)، رابطه (۴) حاصل می‌شود.

$$f[(ab + ba)w] = [f(a)f(b) + f(b)f(a)] \cdot w. \quad (۴)$$

بنابه نتیجه ۵،

$$f[(ab + ba)w] = f(ab + ba) \cdot w. \quad (۵)$$

از روابط (۴) و (۵) نتیجه می‌شود که

$$(f(ab + ba) - [f(a)f(b) + f(b)f(a)]) \cdot w = 0.$$

چون w یک نقطه جداساز راست برای B است، برای هر $a, b \in A$ خواهیم داشت:

$$f(ab + ba) = f(a)f(b) + f(b)f(a).$$

بنابراین f یک همریختی ژوردان است. در نتیجه بنابر لم ۳.۲.۶ از [۱۵]، f یک n -همریختی ژوردان است. قسمت

(ب) از نتیجه ۵ و قسمت (الف) نتیجه می‌شود.

نتیجه ۸. با فرضیات قضیه ۷، f یک n -همریختی است اگر

الف) A و B جابه‌جایی باشند، یا

ب) B نیم‌ساده و جابه‌جایی باشد.

برهان: الف) بنابر آنچه که در اثبات قضیه ۷ بیان شد، برای هر $a, b \in A$

$$f(ab + ba) = f(a)f(b) + f(b)f(a).$$

چون A و B جابه‌جایی است، از این‌رو، $f(ab) = f(a)f(b)$. بنابراین f یک همریختی و در نتیجه یک n -همریختی است.

برای قسمت (ب) فرض کنید B نیم‌ساده و جابه‌جایی باشد. بنابه قضیه قبل f یک n -همریختی ژوردان است، از این‌رو، بنابه نتیجه ۵.۲ از [۱]، f یک n -همریختی است.

نتیجه ۹. فرض کنید $f: A \rightarrow B$ یک شبه n -همریختی ژوردان یکانی با ضریب ژوردان w باشد به‌طوری‌که w یک نقطه جداساز راست برای B است. در این صورت تحت هر کدام از شرایط زیر f پیوسته است.

الف) B نیم‌ساده و جابه‌جایی باشد.

ب) B نیم‌ساده و f پوشا باشد.

ج) B یک C^* -جبر و f پوشا باشد.

برهان: بنابه قضیه ۲، f یک شبه همریختی ژوردان است، از این‌رو، بنابه قضیه ۷، f یک همریختی ژوردان است.

بنابراین طبق نتایج ۹.۲، ۱۰.۲ و ۱۱.۲ از [۱۹] نتیجه دلخواه حاصل می‌شود.

قضیه ۱۰. فرض کنید $f: A \rightarrow B$ یک شبه ۳-هم‌ریختی ژوردان یکانی با ضریب ژوردان w باشد به‌طوری که w یک نقطه جداساز راست برای B است. فرض کنید B جابه‌جایی باشد و برای هر $a, b, c \in A$

$$f(abcw) = f(acbw). \quad (۶)$$

در این صورت f یک هم‌ریختی و در نتیجه n -هم‌ریختی است.

برهان: فرض کنید e عنصر همانی A باشد. با جای‌گذاری e به‌جای a در رابطه (۶)، برای هر $b, c \in A$ تساوی زیر را به‌دست می‌آوریم:

$$f(bcw) = f(cbw).$$

$$\text{بنابراین } f((ab)cw) = f(c(ab)w) = f(c(ba)w) \text{ و}$$

$$f(a(bc)w) = f((bc)aw) = f(b(ca)w) = f(b(ac)w).$$

از این‌رو،

$$f(abcw) = f(xyzw) \quad (۷)$$

که در آن (x, y, z) یک جای‌گشت از (a, b, c) است. چون f یک شبه ۳-هم‌ریختی ژوردان است، از این‌رو، برای هر $a \in A$

$$f(a^3w) = f(a)^3 \cdot w. \quad (۸)$$

با جای‌گذاری $a + b$ به‌جای a در رابطه (۸)، داریم:

$$f[(ab^2 + b^2a + ba^2 + a^2b + aba + bab)w] = [3f(a)f(b)^2 + 3f(a)^2f(b)] \cdot w. \quad (۹)$$

با تغییر b با $-b$ در رابطه (۹)، رابطه (۱۰) به‌دست می‌آید.

$$f[(ab^2 + b^2a - ba^2 - a^2b - aba + bab)w] = [3f(a)f(b)^2 - 3f(a)^2f(b)] \cdot w. \quad (۱۰)$$

از روابط (۹) و (۱۰)، ۱۱ حاصل می‌شود.

$$f[(ab^2 + b^2a + bab)w] = 3f(a)f(b)^2 \cdot w. \quad (۱۱)$$

با جای‌گذاری $b - c$ به‌جای b در رابطه (۱۱)، داریم:

$$f[(abc + acb + bac + bca + cab + cba)w] = [6f(a)f(b)f(c)] \cdot w \quad (۱۲)$$

از رابطه (۷) و (۱۲) نتیجه می‌شود که

$$f(abcw) = [f(a)f(b)f(c)] \cdot w.$$

با جای‌گذاری e به‌جای c در تساوی مذکور و با به‌کارگیری لم ۵، برای هر $a, b \in A$ این تساوی به‌دست می‌آید:

$$(f(ab) - [f(a)f(b)]) \cdot w = 0.$$

چون w یک نقطه جداساز راست برای B است، از این‌رو، برای هر $a, b \in A$ داریم، $f(ab) = f(a)f(b)$ ، بنابراین f یک هم‌ریختی و در نتیجه یک n -هم‌ریختی است.

تقدیر و تشکر

از نقطه نظر داوران محترم در بارهٔ اصلاحات علمی تشکر می‌شود. این تحقیق در قالب طرح پژوهشی شماره ۱۶۸۱۴۱-۱۵۶۶۴ با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه ایت ا... العظمی بروجردی انجام شده است.

منابع

1. An G., "Characterization of n -Jordan homomorphism, Linear and Multilinear algebra", 66 (4) (2018) 671-680.
2. Bodaghi A., Inceboz H., " n -Jordan homomorphisms on commutative algebras", Acta. Math. Univ. Comenianae, 87 (1) (2018) 141-146.
3. Bodaghi A., Inceboz H., "Extension of Zelazko's theorem to n -Jordan homomorphisms", Adv. Pure. Appl. Math. 10 (2) (2019) 165-170.
4. Bracic J., Moslehian M. S., "On automatic continuity of 3-homomorphisms on Banach algebras", Bull. Malaysian. Math. Sci. Soc., 30 (2) (2007) 195-200.
5. Ebadian A., Jabari A., Kanzi N., " n -Jordan homomorphisms and Pseudo n -Jordan homomorphisms on Banach algebras", Mediterr. J. Math., 14 (241) (2017) 1-11.
6. Eshaghi M., Gordji, " n -Jordan homomorphisms", Bull. Aust. Math. Soc., 80 (1) (2009) 159-164.
7. Gordji M. E., Karimi T., Gharetapeh S. K., "Approximately n -Jordan homomorphisms on Banach algebras", J. Ineq. Appl., Article ID 870843 (2009) 1-8.
8. Gselmann E., "On approximate n -Jordan homomorphisms", Annales Math. Silesianae, 28 (2014) 47-58.
9. Hejazian Sh., Mirzavaziri M., Moslehian M. S., " n -homomorphisms", Bull. Iranian Math. Soc., 31 (1) (2005) 13-23.
10. Herstein I. N., "Jordan homomorphisms", Trans. Amer. Math. Soc., 81 (1) (1956) 331-34.
11. Jacobson N., Rickart C. E., "Jordan homomorphisms of rings", Trans. Amer. Math. Soc., 69 (3) (1950) 479-502.
12. Lee Y. H., "Stability of n -Jordan homomorphisms from a Normed Algebra to a Banach Algebra", Abst. Appl. Anal., 2013, Article ID 691025 (2013) 1-5.
13. Lu F., "Characterizations of derivations and Jordan derivations on Banach algebras", Linear Algebra and its Applications., 430 (2009) 2233-2239.
14. Miura T., Takahasi S. E., Hirasawa G., "Hyers-Ulam-Rassias stability of Jordan homomorphisms, on Banach algebras", J. Ineq. Appl., 2005 (4) (2005) 435-441.
15. Palmer T., "Banach algebras and the general theory of $*$ -algebras", Vol I, Cambridge: Univ Press (1994).
16. Zelazko W., "A characterization of multiplicative linear functionals in complex Banach algebras", Studia Math., 30 (1968) 83-85.
17. Zivari-kazempour A., "A characterization of 3-Jordan homomorphism on Banach algebras", Bull. Aust. Math. Soc., 93 (2) (2016) 301-306.

18. Zivari-Kazempour A., "A characterization of Jordan and 5-Jordan homomorphisms between Banach algebras", Asian-European J. Math., 11 (2) (2018) 1-10.
19. Zivari-kazempour A., "Automatic continuity of n-Jordan homomorphisms on Banach algebras", Commu. Korean Math. Soc., 33 (1) (2018) 165-170.