

## تقریب‌پذیری در فضاهای لیپ‌شیتس برداری مقدار

کبرا اسمعیلی بریران

دانشگاه اردکان، دانشکده فنی و مهندسی

پذیرش ۹۸/۰۸/۱۳

دریافت ۹۸/۰۴/۲۱

### چکیده

در این مقاله، معیارهایی برای بررسی چگال بودن برخی زیرفضاهای فضای لیپ‌شیتس برداری مقدار  $\text{lip}_\alpha(X, S)$  وقتی  $(X, d)$  فضای متریک فشرده،  $S$  فضای باناخ روی میدان مختلط  $\mathbb{C}$  است و  $0 < \alpha < 1$ ، ارائه می‌شود. درحالتی که  $X = [a, b]$  ثابت می‌شود  $\text{Lip}_1([a, b], S)$  در  $\text{lip}_\alpha([a, b], S)$  چگال است. همچنین با استفاده از فضاهای باختر و فضاهای دوگان ثابت می‌شود  $C^1([a, b], S)$  فضای توابع  $S$ -مقدار به‌طور پیوسته مشتق‌پذیر روی  $[a, b]$  در  $\text{lip}_\alpha([a, b], S)$  چگال است.

**واژه‌های کلیدی:** فضای توابع لیپ‌شیتس برداری مقدار، توابع برداری مقدار به‌طور پیوسته مشتق‌پذیر، اندازه‌برداری، تقریب‌پذیری

### مقدمات و پیش‌نیازها

فرض کنید  $(X, d)$  فضای متریک،  $(S, \|\cdot\|_S)$  فضای باناخ روی میدان مختلط  $\mathbb{C}$  است و  $0 < \alpha \leq 1$ . فضای برداری متشکل از همه توابع  $S$ -مقدار کراندار  $f$  روی  $X$  با شرط

$$p_{\alpha, S}(f) = \sup \left\{ \frac{\|f(x) - f(y)\|_S}{d^\alpha(x, y)} : x, y \in X, x \neq y \right\} < \infty$$

را با  $\text{Lip}_\alpha(X, S)$  نمایش می‌دهیم. زیرفضایی از  $\text{Lip}_\alpha(X, S)$  متشکل از تمامی توابع با شرط

$$\lim_{d(x, y) \rightarrow 0} \frac{\|f(x) - f(y)\|_S}{d^\alpha(x, y)} = 0$$

را با  $\text{lip}_\alpha(X, S)$  نمایش می‌دهیم. با تعریف نرم  $\|f\|_{\alpha, S} = \|f\|_X + p_{\alpha, S}(f)$  به‌ازای هر  $f \in \text{Lip}_\alpha(X, S)$  که در آن  $\| \cdot \|_X$  نرم سوپر‌نرم روی  $X$  است، به‌راحتی می‌توان ثابت کرد که  $(\text{Lip}_\alpha(X, S), \| \cdot \|_{\alpha, S})$  فضای باناخ است و  $\text{lip}_\alpha(X, S)$  زیرفضای بسته  $\text{Lip}_\alpha(X, S)$  است. فضاهای  $\text{Lip}_\alpha(X, S)$  و  $\text{lip}_\alpha(X, S)$  را فضاهای لیپ‌شیتس  $S$ -مقدار می‌نامیم. در حالتی که  $S$  میدان اعداد مختلط  $\mathbb{C}$  باشد، به‌ترتیب از نمادهای  $\text{Lip}_\alpha(X)$  و  $\text{lip}_\alpha(X)$  به‌جای  $\text{Lip}_\alpha(X, \mathbb{C})$  و  $\text{lip}_\alpha(X, \mathbb{C})$  استفاده می‌کنیم. جانسون [۴] فضاهای لیپ‌شیتس برداری مقدار را بررسی کرد. در حالت اسکالر مقدار، فضاهای لیپ‌شیتس جبرهای باناخ هستند و به آنها جبرهای لیپ‌شیتس گفته می‌شود. این جبرها به‌طور گسترده بررسی شده‌اند [۱]، [۴]، [۶]، [۷]. در [۴] با به‌کارگیری قضیه استون-وایرستراس برای جبرهای لیپ‌شیتس منصوب به هدربرگ [۳] ثابت شد که وقتی  $0 < \alpha < 1$  جبر  $\text{Lip}_1(X)$  در  $\text{lip}_\alpha(X)$  چگال است. همین

نتیجه، با استفاده از نظریه اندازه‌ها و فضاهای دوگان و با برهانی متفاوت در [۱] به اثبات رسیده است. در این مقاله، با به‌کارگیری روش به‌کار گرفته شده در [۱] و به‌کمک فضای اندازه‌های برداری مقدار روی  $X$  معیاری ارائه می‌دهیم که چگال بودن برخی زیرفضاهای  $\text{lip}_\alpha(X, S)$  را مشخص می‌کند. سپس نشان می‌دهیم  $\text{Lip}_1([a, b], S)$  در  $\text{lip}_\alpha([a, b], S)$  چگال است. در نهایت، با استفاده از فضاهای باختر و دوگان ثابت می‌کنیم  $C^1([a, b], S)$  در  $\text{lip}_\alpha([a, b], S)$  چگال است. در بخش بعدی، پس از ارائه تعاریف و نمادهای اولیه، نتایج اصلی را ثابت می‌کنیم.

### نتایج اصلی

فرض کنید  $X$  فضای هاسدورف موضعاً فشرده و  $S$  فضای باناخ روی میدان اعداد مختلط باشد. فضای متشکل از همه توابع پیوسته و کراندار از  $X$  به‌توی  $S$  با  $C(X, S)$  و زیرفضایی از  $C(X, S)$  متشکل از همه توابعی که در بینهایت صفر می‌شوند با  $C_0(X, S)$  نشان داده می‌شوند. این فضاها با نرم سوپرهم،  $\|f\|_X = \sup_{x \in X} \|f(x)\|_S$ ، فضای باناخ هستند. در حالتی که  $S = \mathbb{C}$ ، این فضاها به‌ترتیب با  $C(X)$  و  $C_0(X)$  نشان داده می‌شوند. فضای متشکل از همه اندازه‌های مختلط بورل منظم روی  $X$  را با  $M(X)$  و فضای دوگان فضای باناخ  $S$  با  $S^*$  نشان داده می‌شود. فضای اندازه‌های بورل منظم  $S^*$ -مقدار  $\mu$  روی  $X$  که در شرایط زیر صدق کنند با  $M(X, S^*)$  نشان داده می‌شود:

- i. برای هر  $s \in S$ ،  $\langle s, \mu(\cdot) \rangle \in M(X)$ ؛
- ii. ثابت  $C$  وجود دارد به‌طوری‌که  $\sup |\langle s_i, \mu(A_i) \rangle| \leq C$  سوپرهم در این رابطه روی همه افزایش‌های متناهی  $X$  متشکل از مجموعه‌های بورل منظم دو به دو مجزا  $\{A_i\}$  و مجموعه نقاط  $\{S_i\}$  در  $S$  با شرط  $\|s_i\|_S \leq 1$  گرفته می‌شود.

اندازه  $\mu \in M(X, S^*)$  و  $s \in S$  را در نظر بگیرید. اندازه  $\mu_s$  در  $M(X)$  چنین تعریف می‌شود که به‌ازای هر مجموعه بورل  $A$  در  $X$  داشته باشیم  $\mu_s(A) = \langle s, \mu(A) \rangle$ . تغییرات کلی  $\mu_s$  با نماد  $|\mu_s|$  مشخص می‌شود و هم‌چنین  $\|\mu\|_S = |\mu_s|(X)$ . تغییرات کلی اندازه  $\mu$  با نماد  $|\mu|$  مشخص شده و به‌صورت  $|\mu|(A) = \sup \left| \sum \langle s_i, \mu(A_i) \rangle \right|$  تعریف می‌شود. سوپرهم در این رابطه، مشابه ii در تعریف اندازه‌های بورل منظم  $S^*$ -مقدار، روی افزایش‌های متناهی  $A$  در نظر گرفته می‌شود. به‌راحتی می‌توان نشان داد که  $|\mu| \in M(X)$ . قرار می‌دهیم  $\|\mu\| = |\mu|(X)$ .

فرض کنید  $\mu \in M(X, S^*)$ . به‌ازای هر  $f \in C(X, S)$ ، به‌صورت انتگرال ریمن-اشتیل یس، از حدگیری روی تقریف‌های پی‌درپی مجموعه‌های به فرم  $\sum \langle f(x_i), \mu(A_i) \rangle$  به‌دست می‌آید که در آن  $\{A_i\}$  افزایش‌های متناهی  $X$  به مجموعه‌های بورل دو به دو مجزا است و  $x_i \in A_i$ . برای جزئیات بیشتر تر به [۸] رجوع کنید.

فرض کنید  $(X, d)$  فضای متریک فشرده باشد،  $V = \{(x, y) \in X \times X : x \neq y\}$  و  $\tilde{X} = X \cup V$  در این صورت  $\tilde{X}$  فضایی موضعاً فشرده است.  $0 < \alpha \leq 1$  را ثابت در نظر بگیرید. برای  $f \in C(X, S)$  تابع  $\tilde{f}$  را روی  $\tilde{X}$  به‌صورت

$$\begin{cases} \tilde{f}(x) = f(x) & x \in X \\ \tilde{f}(y, z) = \frac{f(y) - f(z)}{d^\alpha(y, z)} & (y, z) \in V \end{cases}$$

تعریف می کنیم. به راحتی می توان نشان داد که نگاشت  $f \mapsto \tilde{f}$  یک عملگر خطی طول پا از  $(\text{Lip}_\alpha(X, S), \|\cdot\|_{\alpha, S})$  به توی  $(C(\tilde{X}, S), \|\cdot\|_{\tilde{X}})$  است که در آن  $\|\tilde{f}\|_{\tilde{X}} = \|f\|_X + \|f\|_V$ . هم چنین تصویر  $\text{lip}_\alpha(X, S)$  تحت این نگاشت در  $C_0(\tilde{X}, S)$  قرار می گیرد.

قبل از ارائه نتایج اصلی، به بیان دو لم می پردازیم که مشابه نتایج [۱] در حالت اسکالر مقدار هستند.

لم ۱. به ازای هر  $\mu \in M(\tilde{X}, S^*)$  و  $\varepsilon > 0$ ، اندازه  $\nu \in M(X, S^*)$  وجود دارد به طوری که

$$\left| \int_{\tilde{X}} \tilde{f} d\mu - \int_X f d\nu \right| < \varepsilon \|f\|_{\alpha, S}, \quad f \in \text{Lip}_\alpha(X, S).$$

برهان. با توجه به این که  $|\mu| \in M(\tilde{X})$ ، زیرمجموعه فشرده  $K$  از  $V$  یافت می شود به طوری که  $|\mu|(V \setminus K) < \varepsilon$  قرار دهید

$$\Phi(f) = \int_{X \cup K} \tilde{f} d\mu, \quad f \in C(X, S).$$

واضح است که  $\Phi$  تابعک خطی روی  $C(X, S)$  است. نشان می دهیم تابعک خطی  $\Phi$  کران دار است. افراز متناهی  $\{A_i\}$  از مجموعه  $X \cup K$ ، متشکل از مجموعه های بول دوه دو مجزا را در نظر بگیرید و فرض کنید  $\{\tilde{x}_i\}$  دنباله ای متناهی در  $X \cup K$  باشد به طوری که  $\tilde{x}_i \in A_i$  در این صورت به ازای هر  $f \in C(X, S)$  داریم

$$\begin{aligned} \left| \sum \langle \tilde{f}(\tilde{x}_i), \mu(A_i) \rangle \right| &\leq \sum \|\mu(A_i)\| \|\tilde{f}(\tilde{x}_i)\|_S \\ &\leq \sum \|\mu(A_i)\| \|\tilde{f}\|_{X \cup K} \\ &\leq |\mu|(X \cup K) \|\tilde{f}\|_{X \cup K}. \end{aligned}$$

با فرض  $\delta > 0$  و  $\delta = \inf \{d^\alpha(y, z) : (y, z) \in K\}$  نتیجه می شود

$$\tilde{f}_{X \cup K} = \|f\|_X + \|\tilde{f}\|_K \leq \left(1 + \frac{2}{\delta}\right) \|f\|_X.$$

بنابراین برای هر افراز  $\{A_i\}$  از  $X \cup K$  و  $\tilde{x}_i \in A_i$  داریم

$$\left| \sum \langle \tilde{f}(\tilde{x}_i), \mu(A_i) \rangle \right| \leq \left(1 + \frac{2}{\delta}\right) \|f\|_X |\mu|(X \cup K).$$

باتوجه به تعریف انتگرال ریمان-اشتیل یس می توان نتیجه گرفت

$$|\Phi(f)| = \left| \int_{X \cup K} \tilde{f} d\mu \right| \leq \left(1 + \frac{2}{\delta}\right) \|f\|_X |\mu|(X \cup K),$$

که کران داری تابعک خطی  $\Phi$  روی  $C(X, S)$  را به دنبال دارد. با به کارگیری [لم ۴، ۸]، می توان اندازه  $\nu \in M(X, S^*)$  را یافت به طوری که

$$\Phi(f) = \int_X f d\nu, \quad f \in C(X, S).$$

به ازای  $f \in \text{Lip}_\alpha(X, S)$ ، نتیجه می شود

$$\left| \int_{\tilde{X}} \tilde{f} d\mu - \int_X f d\nu \right| = \left| \int_{V \setminus K} \tilde{f} d\mu \right| \leq \|\tilde{f}\|_{V \setminus K} |\mu|(V \setminus K) \leq \varepsilon \tilde{f}_X = \varepsilon \|f\|_{\alpha, S}.$$

قبل از بیان لم بعدی، ابتدا به معرفی برخی نمادها می‌پردازیم. به‌ازای هر  $s^* \in S^*$  و  $x \in X$ ، تابع  $s^* \otimes \varepsilon_x$  روی  $Lip_\alpha(X, S)$  با ضابطه  $(s^* \otimes \varepsilon_x)(f) = \langle f(x), s^* \rangle$  را در نظر بگیرید. واضح است که  $s^* \otimes \varepsilon_x$  تابع خطی و کران‌دار روی  $C(X, S)$  است. بنابر [لم ۴، ۸] اندازه  $\mu \in M(X, S^*)$  وجود دارد به‌طوری‌که

$$\langle f(x), s^* \rangle = (s^* \otimes \varepsilon_x)(f) = \int_X f d\mu, \quad f \in C(X, S).$$

به‌ازای هر مجموعه بورل  $A$  در  $X$  اندازه  $\delta_{x, s^*}$  را بدین‌صورت تعریف می‌کنیم

$$\delta_{x, s^*}(A) = \begin{cases} s^* & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases}.$$

واضح است که  $\delta_{x, s^*} \in M(X, S^*)$  و تکیه‌گاه آن برابر  $\{x\}$  است. هم‌چنین برای هر  $f \in C(X, S)$  داریم

$$\int_X f d\delta_{x, s^*} = \int_X s^* \circ f d\delta_x = \langle f(x), s^* \rangle = (s^* \otimes \varepsilon_x)(f) \quad (۱)$$

که در آن اندازه جرم نقطه‌ای در  $X$  است. بنابراین  $\delta_{x, s^*}$  یک اندازه نمایشی برای تابع  $s^* \otimes \varepsilon_x$  است. رابطه (۱) را برای هر  $f \in Lip_\alpha(X, S)$  داریم.

لم ۲. فرض کنید  $v \in M(X, S^*)$  و  $\varepsilon > 0$ . در این‌صورت اندازه  $\lambda \in M(X, S^*)$  با تکیه‌گاه متناهی وجود دارد که

$$\left| \int_X f d\nu - \int_X f d\lambda \right| < \varepsilon \|f\|_{\alpha, S}, \quad f \in lip_\alpha(X, S).$$

برهان. تابع خطی و کران‌دار  $\Phi_v(f) = \int_X f d\nu$  روی  $lip_\alpha(X, S)$  را در نظر بگیرید. با استفاده از [لم ۵، ۲.۵]، تابع‌های خطی  $s_1^*, s_2^*, \dots, s_n^* \in S^*$  و  $x_1, x_2, \dots, x_n \in X$  وجود دارند به‌طوری‌که

$$\left\| \Phi_v - \sum_{i=1}^n s_i^* \otimes \varepsilon_{x_i} \right\| < \varepsilon.$$

تعریف می‌کنیم  $\lambda = \sum_{i=1}^n \delta_{x_i, s_i^*}$ . در این‌صورت  $\lambda$  اندازه‌ای با تکیه‌گاه  $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  در  $M(X, S^*)$  بوده است و برای هر  $f \in lip_\alpha(X, S)$  داریم

$$\begin{aligned} \left| \int_X f d\nu - \int_X f d\lambda \right| &= \left| \Phi_v(f) - \sum_{i=1}^n \int_X f d\delta_{x_i, s_i^*} \right| \\ &= \left| \Phi_v(f) - \sum_{i=1}^n (s_i^* \otimes \varepsilon_{x_i})(f) \right| \\ &\leq \left\| \Phi_v - \sum_{i=1}^n (s_i^* \otimes \varepsilon_{x_i}) \right\| \|f\|_{\alpha, S} \\ &< \varepsilon \|f\|_{\alpha, S}. \end{aligned}$$

با به‌کارگیری لم‌های فوق، قضیه تقریب‌پذیری زیر را ثابت می‌کنیم. مشابه این قضیه در حالت اسکالر مقدار را می‌توان در [۱] ملاحظه کرد.

**قضیه ۳.** زیرفضای  $L$  از  $\text{lip}_\alpha(X, S)$  را در نظر بگیرید. فرض کنید عدد ثابت  $C$  وجود دارد به طوری که برای هر زیرمجموعه متناهی  $E$  از  $X$  و هر  $f \in \text{lip}_\alpha(X, S)$  بتوان تابع  $g \in L$  را یافت به طوری که روی  $E$  داشته باشیم  $f = g$  و  $\|g\|_{\alpha, S} \leq C \|f\|_{\alpha, S}$  در این صورت  $L$  در  $\text{lip}_\alpha(X, S)$  چگال است.

**برهان.** تابع خطی و کران‌دار  $\Phi \in \text{lip}_\alpha(X, S)^*$  را در نظر بگیرید به طوری که روی  $L$ ،  $\Phi = 0$ . با استفاده از قضیه هان-باناخ،  $\Phi$  دارای توسیع حافظ نرم روی  $(C_0(\bar{X}, S), \bar{X})$  است و بنابر [۸، ۴]، اندازه  $\mu \in M(\bar{X}, S^*)$  وجود دارد به طوری که

$$\Phi(f) = \int_{\bar{X}} \tilde{f} d\mu, \quad f \in \text{lip}_\alpha(X, S).$$

برای  $\varepsilon > 0$  دلخواه، بنابر لم‌های ۱ و ۲، اندازه  $\lambda \in M(X, S^*)$  با تکیه‌گاه متناهی  $E$  یافت می‌شود به طوری که

$$\left| \Phi(f) - \int_X f d\lambda \right| \leq 2\varepsilon \|f\|_{\alpha, S}, \quad f \in \text{lip}_\alpha(X, S).$$

تابع  $f \in \text{lip}_\alpha(X, S)$  را در نظر بگیرید. با توجه به فرض مسئله، تابع  $g \in L$  یافت می‌شود به طوری که روی  $E$  داریم  $f = g$  و هم‌چنین  $\|g\|_{\alpha, S} \leq C \|f\|_{\alpha, S}$  بنابرین

$$\left| \Phi(g) - \int_X g d\lambda \right| \leq 2\varepsilon \|g\|_{\alpha, S} \leq 2\varepsilon C \|f\|_{\alpha, S}.$$

باتوجه به این‌که  $\Phi(g) = 0$  و  $\int_X g d\lambda = \int_X f d\lambda$ ، نتیجه می‌شود  $|\Phi(f)| \leq 2(C+1)\varepsilon \|f\|_{\alpha, S}$ . بنابرین  $\Phi(f) = 0$  و  $\Phi = 0$ . در نتیجه  $L$  در  $\text{lip}_\alpha(X, S)$  چگال است.

قضیه ۴ نتیجه‌ای مشابه [۱، ۳.۳] در حالت برداری مقدار ارائه می‌دهد. هرچند برهان به‌کار رفته در [۱] برای حالت برداری مقدار قابل استفاده نیست.

**قضیه ۴.** به‌ازای هر  $f \in \text{lip}_\alpha([a, b], S)$  و هر زیرمجموعه متناهی  $E$  از  $[a, b]$ ، تابع  $g \in \text{Lip}_1([a, b], S)$  وجود دارد به طوری که  $f = g$  روی  $E$  و  $\|g\|_{\alpha, S} \leq 3\|f\|_{\alpha, S}$ .

**برهان.** فرض کنید  $I = [a, b]$  و  $E = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  به طوری که  $a < x_1 < \dots < x_n < b$ . قرار می‌دهیم  $x_0 = a$  و  $x_{n+1} = b$  و تعریف می‌کنیم

$$L_i(x) = f(x_{i-1}) + \frac{x-x_{i-1}}{x_i-x_{i-1}} (f(x_i) - f(x_{i-1})), \quad x \in [x_{i-1}, x_i]$$

و

$$g(x) = L_i(x), \quad x \in [x_{i-1}, x_i].$$

در این صورت تابع  $g: I \rightarrow S$  پیوسته است و برای  $i = 1, 2, \dots, n$  داریم  $g(x_i) = L_i(x_i) = f(x_i)$  بنابرین  $f = g$  روی  $E$ . نشان می‌دهیم  $g \in \text{Lip}_1(I, S)$  و  $\|g\|_{\alpha, S} \leq 3\|f\|_{\alpha, S}$ . فرض کنید  $\gamma = \min \{x_i - x_{i-1} : i = 1, \dots, n\}$  بنابرین  $\gamma > 0$ . برای  $x, y \in I$  با شرط  $x < y$  دو حالت اتفاق می‌افتد:

**حالت اول.** به‌ازای  $i \in \{1, \dots, n+1\}$ ، داشته باشیم  $x_{i-1} \leq x < y \leq x_i$ . در این حالت  $y - x \leq x_i - x_{i-1}$  و در نتیجه

$$\|g(x) - g(y)\|_S = \|L_i(x) - L_i(y)\|_S = \frac{y-x}{x_i-x_{i-1}} \|f(x_i) - f(x_{i-1})\|_S.$$

بنابرین

$$\frac{\|g(x)-g(y)\|_S}{|x-y|} = \frac{\|f(x_i)-f(x_{i-1})\|_S}{x_i-x_{i-1}} \leq \frac{2\|f\|_I}{\gamma}, \tag{۲}$$

و

$$\frac{\|g(x)-g(y)\|_S}{|x-y|^\alpha} = \frac{\|f(x_i)-f(x_{i-1})\|_S}{(x_i-x_{i-1})^\alpha} \frac{(y-x)^{1-\alpha}}{(x_i-x_{i-1})^{1-\alpha}} \leq p_{\alpha,S}(f). \tag{۳}$$

حالت دوم: برای  $i, j \in \{1, \dots, n+1\}$  داشته باشیم  $x \in [x_{i-1}, x_i]$  و  $y \in [x_{j-1}, x_j]$  به طوری که  $x_i \leq x_{j-1}$  در این حالت، با در نظر گرفتن  $x_i < x_{j-1}$  داریم

$$\begin{aligned} \|g(x)-g(y)\|_S &= \|L_i(x)-L_j(y)\|_S \\ &\leq \|L_i(x)-f(x_i)\|_S + \|f(x_i)-f(x_{j-1})\|_S + \|f(x_{j-1})-L_j(y)\|_S \\ &= \left\| \frac{x-x_i}{x_i-x_{i-1}} (f(x_i)-f(x_{i-1})) \right\|_S + \|f(x_i) - f(x_{j-1})\|_S \\ &\quad + \left\| \frac{y-x_{j-1}}{x_j-x_{j-1}} (f(x_j) - f(x_{j-1})) \right\|_S \\ &= \|f(x_i) - f(x_{i-1})\|_S \frac{x_i-x}{x_i-x_{i-1}} + \|f(x_i) - f(x_{j-1})\|_S \\ &\quad + \|f(x_j) - f(x_{j-1})\|_S \frac{y-x_{j-1}}{x_j-x_{j-1}}. \end{aligned}$$

بنابراین

$$\begin{aligned} \frac{\|g(x) - g(y)\|_S}{|x-y|} &\leq \frac{2}{\gamma} \|f\|_I \frac{x_i-x}{y-x} + \frac{\|f(x_i)-f(x_{j-1})\|_S}{(x_{j-1}-x_i)^\alpha} \frac{(x_{j-1}-x_i)}{(y-x)(x_{j-1}-x_i)^{1-\alpha}} \\ &\quad + \frac{2}{\gamma} \|f\|_I \frac{y-x_{j-1}}{y-x} \\ &\leq \frac{4}{\gamma} \|f\|_I + \frac{1}{\gamma^{1-\alpha}} p_{\alpha,S}(f), \end{aligned} \tag{۴}$$

و

$$\begin{aligned} \frac{\|g(x)-g(y)\|_S}{|x-y|^\alpha} &\leq \frac{\|f(x_i)-f(x_{i-1})\|_S}{(x_i-x_{i-1})^\alpha} \left(\frac{x_i-x}{y-x}\right)^\alpha \left(\frac{x_i-x}{x_i-x_{i-1}}\right)^{1-\alpha} \\ &\quad + \frac{\|f(x_i)-f(x_{j-1})\|_S}{(x_{j-1}-x_i)^\alpha} \left(\frac{x_{j-1}-x_i}{y-x}\right)^\alpha \\ &\quad + \frac{\|f(x_j)-f(x_{j-1})\|_S}{(x_j-x_{j-1})^\alpha} \left(\frac{y-x_{j-1}}{y-x}\right)^\alpha \left(\frac{y-x_{j-1}}{x_j-x_{j-1}}\right)^{1-\alpha} \\ &\leq 3 p_{\alpha,S}(f). \end{aligned} \tag{۵}$$

ملاحظه می‌کنیم که روابط (۴) و (۵) برای حالت  $x_i = x_{j-1}$  برقرار است.

در هر دو حالت فوق، بنا بر رابطه (۲) یا (۴) نتیجه می‌گیریم  $g \in Lip_1(I, S)$  و از رابطه (۳) یا (۵) نتیجه می‌گیریم  $p_{\alpha,S}(g) \leq 3 p_{\alpha,S}(f)$ . از طرف دیگر، فرض کنید  $x \in I$ . در این صورت به‌ازای یک  $i$  داریم  $x \in [x_{i-1}, x_i]$ . در نتیجه

$$\|g(x)\|_S = \|L_i(x)\|_S = \left\| \frac{x_i-x}{x_i-x_{i-1}} f(x_{i-1}) + \frac{x-x_{i-1}}{x_i-x_{i-1}} f(x_i) \right\|_S \leq 2\|f\|_I,$$

که نتیجه می‌دهد  $\|g\|_I \leq 2\|f\|_I$ . بنابراین

$$\|g\|_{\alpha,S} = \|g\|_1 + p_{\alpha,S}(g) \leq 2\|f\|_1 + 3 p_{\alpha,S}(f) \leq 3\|f\|_{\alpha,S}.$$

به عنوان نتیجه مستقیم قضیه های ۳ و ۴ داریم:

نتیجه ۵. زیر فضای  $Lip_1([a,b], S)$  در  $lip_\alpha([a,b], S)$  چگال است.

نتیجه ۶. فرض کنید  $0 < \alpha < \beta < 1$  در این صورت زیر فضاهای  $Lip_\beta([a,b], S)$  و  $lip_\beta([a,b], S)$  در  $lip_\alpha([a,b], S)$  چگال هستند.

برهان. با استفاده از نتیجه ۵ و با بستارگیری از روابط

$$Lip_1([a,b], S) \subseteq lip_\beta([a,b], S) \subseteq Lip_\beta([a,b], S) \subseteq lip_\alpha([a,b], S)$$

تحت نرم  $lip_\alpha([a,b], S)$ ، نتیجه مطلوب حاصل می شود.

در ادامه، نشان می دهیم  $C^1([a,b], S)$  زیر فضای چگال  $lip_\alpha([a,b], S)$  است. واضح است که  $C^1([a,b], S) \subseteq lip_\alpha([a,b], S)$  و مشابه [۴] ثابت می شود

$$\|f\|_{C^1(I,S)} = \|f\|_1 + \|f'\|_1 \approx \|f\|_1 + p_{1,S}(f) = \|f\|_{1,S}.$$

بنابراین  $C^1([a,b], S)$  زیر فضای بسته  $Lip_1([a,b], S)$  است. در حقیقت،  $C^1([a,b], S)$  زیر فضای سرهای از  $Lip_1([a,b], S)$  است. برای اثبات قضیه تقریب پذیری بعدی، به تعاریف و نمادهایی نیاز داریم که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم.

فرض کنید  $S$  فضای باناخ روی میدان اعداد مختلط  $\mathbb{C}$ ،  $\mu$  اندازه مختلط بورل منظم روی فضای هاسدورف و فشرده  $X$  باشد و  $p \in [1, \infty)$ . فضای باختر  $L^p(X, S)$  متشکل از تمامی توابع  $S$ -مقدار اندازه پذیر  $f$  روی  $X$  است که در این رابطه صدق می کنند:

$$\|f\|_{L^p(X,S)} = \left( \int_X \|f(x)\|_S^p d\mu(x) \right)^{1/p} < \infty.$$

در حالتی که  $S = \mathbb{C}$ ،  $L^p(X, \mathbb{C})$  را با  $L^p(X)$  نمایش می دهیم. فرض کنید  $L^p(X) \otimes S$  مجموعه همه ترکیب های خطی متناهی به فرم  $uf$  باشد که  $u \in S$  و  $f \in L^p(X)$ . با استفاده از تعریف انتگرال باختر [۲]، می توان ثابت کرد  $L^p(X) \otimes S$  در  $L^p(X, S)$  چگال است. با توجه به چگال بودن فضای  $C(X)$  در  $L^p(X)$ ، می توان ثابت کرد که به ازای هر  $p \in [1, \infty)$ ، فضای  $C(X, S)$  در  $L^p(X, S)$  چگال است.

با استفاده از مطالب مذکور و لم های ۱ و ۲ قضیه تقریب پذیری ۷ را بیان می کنیم.

قضیه ۷. فرض کنید  $0 < \alpha < 1$ . در این صورت  $C^1([a,b], S)$  در  $lip_\alpha([a,b], S)$  چگال است.

برهان. فرض کنید  $I = [a,b]$  و  $\Phi \in lip_\alpha(I, S)^*$  به طوری که روی  $C^1(I, S)$  داشته باشیم  $\Phi = 0$ . با استفاده از قضیه هان-باناخ،  $\Phi$  دارای توسیع پیوسته حافظ نرم روی  $C_0(\tilde{I}, S)$  است و با استفاده از [۸، لم ۴] اندازه  $\mu \in M(\tilde{I}, S^*)$  وجود دارد به طوری که

$$\Phi(f) = \int_{\tilde{I}} \tilde{f} d\mu, \quad f \in lip_\alpha(I, S).$$

$\varepsilon > 0$  را دلخواه در نظر بگیرید. بنابر لم های ۱ و ۲، اندازه  $\lambda \in M(I, S^*)$  با تکیه گاه متناهی وجود دارد به طوری که

$$\left| \int_{\tilde{I}} \tilde{f} d\mu - \int_I f d\lambda \right| \leq 2\varepsilon \|f\|_{\alpha,S}, \quad f \in lip_\alpha(I, S). \quad (۶)$$

تابع  $f \in \text{lip}_\alpha(I, S)$  با شرط  $\|f\|_{\alpha, S} \leq 1$  را در نظر بگیرید. فرض کنید  $\text{supp } \lambda = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ . مانند برهان قضیه ۴، تابع  $F \in \text{Lip}_1(I, S) \subseteq \text{lip}_\alpha(I, S)$  وجود دارد به طوری که روی  $\text{supp } \lambda$ ،  $F=f$  و  $\|F\|_{\alpha, S} \leq 3\|f\|_{\alpha, S}$  واضح است که  $F$  در همه نقاط  $I$  به جز  $\text{supp } \lambda$  مشتق پذیر است. بنابراین می توان نوشت

$$F(x) = \int_a^x F'(t) dt + f(a), \quad x \in I.$$

اگر قرار دهیم  $\gamma = \min \{|x-y| : x, y \in \text{supp } \lambda\}$  آن گاه برای تقریباً همه نقاط  $x \in I$  داریم  $\|F'(x)\|_S \leq \frac{1}{\gamma^{1-\alpha}} p_{\alpha, S}(f)$ . در نتیجه  $F'$  روی  $I$  به طور اساسی کران دار است و  $\int_a^b \|F'(x)\|_S^p dx < \infty$ .

بنابراین برای هر  $p > 1$  نتیجه می شود  $F' \in L^p(I, S)$ .

عدد مثبت  $q > 1$  با شرط  $\alpha < \frac{1}{q} < 1$  را در نظر بگیرید و قرار دهید  $p = \frac{q}{q-1}$ . بنابر مطالبی که قبل از قضیه بیان کردیم، تابع  $g \in C(I, S)$  وجود دارد به طوری که

$$\|F' - g\|_{L^p(I, S)} = \left( \int_a^b \|F'(x) - g(x)\|_S^p dx \right)^{1/p} < \frac{\varepsilon}{M \|\Phi\|}$$

که در آن  $M = \left( (b-a)^{\frac{1}{q}-\alpha} + (b-a)^\alpha \right) (1 + (b-a)^\alpha)$ . تابع  $G$  را بدین صورت تعریف می کنیم:

$$G(x) = \int_a^x g(t) dt + f(a), \quad x \in I.$$

به راحتی ثابت می شود  $G$  تابعی به طور پیوسته مشتق پذیر روی  $I$  است و  $G' = g$ . به عبارت دیگر،  $G \in C^1(I, S)$ . با به کارگیری نامساوی هولدر به ازای هر  $x \in I$  نتیجه می شود

$$\begin{aligned} \|G(x) - F(x)\|_S &\leq \int_a^x \|g(t) - F'(t)\|_S dt \\ &\leq \left( \int_a^b \|g(t) - F'(t)\|_S^p dt \right)^{1/p} (b-a)^{1/q} \\ &< \frac{\varepsilon (b-a)^{1/q}}{M \|\Phi\|}. \end{aligned}$$

بنابراین

$$\|G - F\|_I = \sup_{x \in I} \|G(x) - F(x)\|_S < \frac{\varepsilon (b-a)^{1/q}}{M \|\Phi\|}. \quad (7)$$

به طریق مشابه، برای هر  $x, y \in I$  با شرط  $x < y$  داریم

$$\begin{aligned} \frac{\|G(x) - F(x) - G(y) + F(y)\|_S}{|x-y|^\alpha} &\leq \frac{1}{|x-y|^\alpha} \left\| \int_x^y g(t) dt - \int_x^y F'(t) dt \right\|_S \\ &\leq \frac{1}{|x-y|^\alpha} \int_x^y \|g(t) - F'(t)\|_S dt \\ &\leq \frac{1}{|x-y|^\alpha} \left( \int_x^y \|g(t) - F'(t)\|_S^p dt \right)^{1/p} |x-y|^{1/q} \\ &< \frac{\varepsilon (b-a)^{1/q-\alpha}}{M \|\Phi\|}. \end{aligned}$$



در نتیجه

$$p_{\alpha,S}(G-F) = \sup_{x \neq y} \frac{\|G(x)-F(x)-G(y)+F(y)\|_S}{|x-y|^\alpha} \leq \frac{\varepsilon (b-a)^{1/q-\alpha}}{M\|\Phi\|}. \quad (8)$$

با جمع کردن روابط (۷) و (۸) داریم

$$\|G-F\|_{\alpha,S} = \|G-F\|_1 + p_{\alpha,S}(G-F) < \frac{\varepsilon \left( (b-a)^{\frac{1}{q}} + (b-a)^{\frac{1}{q}-\alpha} \right)}{M\|\Phi\|}. \quad (9)$$

رابطه (۹) را برای دو حالت ممکن بررسی می کنیم.

**حالت اول:** اگر  $b-a < 1$ ، در این حالت، با توجه به رابطه  $\alpha < \frac{1}{q}$  نتیجه می شود  $(b-a)^\alpha < (b-a)^{\frac{1}{q}}$ . بنابراین

$$\frac{\left( (b-a)^{\frac{1}{q}} + (b-a)^{\frac{1}{q}-\alpha} \right)}{M} < \frac{\left( (b-a)^\alpha + (b-a)^{\frac{1}{q}-\alpha} \right)}{\left( (b-a)^{\frac{1}{q}-\alpha} + (b-a)^\alpha \right) (1+(b-a)^\alpha)} < 1. \quad (10)$$

**حالت دوم:** اگر  $b-a > 1$ ، در این حالت،

$$\frac{\left( (b-a)^{\frac{1}{q}} + (b-a)^{\frac{1}{q}-\alpha} \right)}{M} < \frac{(b-a)^{\frac{1}{q}-\alpha} (1+(b-a)^\alpha)}{\left( (b-a)^{\frac{1}{q}-\alpha} + (b-a)^\alpha \right) (1+(b-a)^\alpha)} < 1. \quad (11)$$

از رابطه های (۹) و (۱۰) و (۱۱) نتیجه می شود

$$\|G-F\|_{\alpha,S} < \frac{\varepsilon}{\|\Phi\|}. \quad (12)$$

از این که  $\Phi(G)=0$  و روی تکیه گاه  $\lambda$ ،  $F=f$ ، با استفاده از رابطه های (۶) و (۱۲) داریم

$$\begin{aligned} |\Phi(f)| &\leq \left| \Phi(f) - \int_I f \, d\lambda \right| + \left| \int_I f \, d\lambda - \Phi(F) \right| + |\Phi(F) - \Phi(G)| \\ &\leq 2\varepsilon \|f\|_{\alpha,S} + \left| \int_I F \, d\lambda - \Phi(F) \right| + |\Phi(F) - \Phi(G)| \\ &\leq 2\varepsilon \|f\|_{\alpha,S} + 2\varepsilon \|F\|_{\alpha,S} + \|\Phi\| \|F-G\|_{\alpha,S} \\ &\leq 8\varepsilon \|f\|_{\alpha,S} + \varepsilon \leq 9\varepsilon. \end{aligned}$$

در نهایت نتیجه  $\Phi=0$  حاصل می شود و این یعنی  $C^1([a,b],S)$  در  $\text{lip}_\alpha([a,b],S)$  چگال است.

### تشکر و قدردانی

از راهنمایی ها و پیشنهادات ارزنده سرکار خانم دکتر حکیمه ماهیار در نگارش این مقاله تشکر و قدردانی می کنم.

### منابع

1. Bade W. G., Curtis, Jr P. C., Dales H. G., "Amenability and weak amenability for Beurling and Lipschitz algebras", Proc. London Math. Soc., 55 (3) (1987) 359-377.
2. Diestel J., Uhl, Jr J., "Vector Measures", Mathematical Surveys and Monographs, AMS, Rhode Island (1977).

3. Hedberg L. I., "The Stone-Weierstrass theorem in Lipschitz algebras", *Ark. Mat.* (1969) 63-72.
4. Honary T. G., Mahyar H., "Approximation in Lipschitz algebras", *Quaest. Math.*, 23 (1) (2000) 13-19.
5. Johnson J. A., "Banach spaces of Lipschitz functions and vector-valued Lipschitz functions", *Trans. Amer. Math. Soc.*, 148 (1970) 147-169.
6. Sherbert D. R., "Banach algebras of Lipschitz functions", *Pacific. J. Math.*, 13 (1963) 1387-1399.
7. Sherbert D. R., "The structure of ideals and point derivations in Banach algebras of Lipschitz functions", *Trans. Amer. Math. Soc.*, 111 (1964) 240-272.
8. Wells J., " Bounded continuous vector-valued functions on a locally compact space", *Mich. Math. J* ۱۲ ., (1965) 119-126.