



Kharazmi University

Categorical Relation between Dimension Groups, C^* -algebras, and Cantor Minimal Systems

Nasser Golestani¹  

1. Department of Pure Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

 E-mail: n.golestani@modares.ac.ir

Article Info

ABSTRACT

Article type:

Research Article

Article history:

Received:

8 May 2021

Received in revised form:

15 May 2021

Accepted:

11 July 2021

Published online:

20 June 2023

Keywords:

classification

functor,

dimension group,

Bratteli diagram,

C^* -algebra,

Cantor minimal system,

orbit equivalence.

Introduction

The category theory gives a common perspective on many notions (such as isomorphism) in different areas of Mathematics, and in some cases enables us to construct bridges between different branches such that tools can be taken from one area to the other. The notion of a functor plays this role. Specifically, if a functor is an equivalence of categories then its domain and codomain categories are essentially the same. However, finding such a functor is very difficult and usually impossible. There are still many functors which are not equivalences of categories but preserve the isomorphism classes, and are suitable for the purpose of classification of certain mathematical objects (such as separable C^* -algebras). These were defined by G. A. Elliott in 2010 and are called classification functors. The main property of such functors is that two objects in the domain category are isomorphic if and only if their images are isomorphic in the codomain category. In particular, if the domain is a complicated category and the codomain is concrete, then such a functor is very useful. As an example, the functor K_0 is a classification functor from the category of AF algebras to the category of dimension groups (by the Elliott classification theorem in 1976).

In this paper, we construct various classification functors between the categories of Bratteli diagrams, dimension groups, AF algebras, and Cantor minimal systems. Some other functors were constructed by Amini, Elliott, and the author in two papers published in 2015 and 2021, and were used to solve an open problem in Dynamical Systems about the finiteness of the rank of factors of finite rank Cantor minimal systems. See the author's joint work with M. Hosseini in 2021 for details.

Material and methods

We use the notion of direct limit to construct a functor from the category of Bratteli diagrams to the category of dimension groups. In this way, we obtain an equivalence of categories. Then we use crossed product C^* -algebras to obtain a functor from the category of Cantor minimal systems to that of AF algebras. Finally, notions of K_0 -groups of Cantor systems and their coboundries are applied to obtain functors into the category of dimension groups.

Results and discussion

We obtain a direct limit functor from the category of Bratteli diagrams to the category of dimension groups, which is an equivalence of categories and hence a classification functor. Suitable notions of morphisms between Cantor minimal systems are defined such that the isomorphism coincide with orbit and strong orbit equivalence. Then two classification functors are obtained from the category of Cantor minimal systems to the category of dimension groups. These classification functors are useful in the study of properties of objects and morphisms of the domain categories using those of the codomain categories.

Conclusion

The following conclusions were drawn from this research.

- The categories of Bratteli diagrams and dimension groups are equivalent, and hence there is a classification functor between them. So, these categories are the same from the categorical point of view.
- There is a suitable notion of morphism between Cantor minimal systems such that the resulting isomorphism is the same as orbit equivalence.
- A functorial formulation of a result of Giordano, Putnam, and Skau concerning strong orbit equivalence of Cantor minimal systems is obtained using the idea of classification functors.

How to cite: Golestani, N. (2023). Categorical Relation between Dimension Groups, C^* -algebras, and Cantor Minimal Systems. *Mathematical Researches*, 9 (1), 164-188.



© The Author(s).

Publisher: Kharazmi University



Kharazmi University

ارتباط رسته‌های بین گروه‌های بعد، C^* -جبرها و سیستم‌های مینیمال کانتور

ناصر گلستانی✉

۱. نویسنده مسئول، گروه ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. رایانامه: n.golestani@modares.ac.ir

چکیده

اطلاعات مقاله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

در این مقاله یک تابعگون حد مستقیم از رسته نمودارهای براتلی به رسته گروه‌های بعد می‌سازیم و نشان می‌دهیم که یک هم‌ارزی رسته‌هاست. مفهوم تابعگون طبقه‌بندی کننده را البوت در سال ۲۰۱۰ برای طبقه‌بندی C^* -جبرهای جدایی‌پذیر معرفی کرد که تابعگونی از یک رسته (معمولاً پیچیده) به یک رسته دیگر (معمولاً ملموس) است و بررسی یک‌ریختی دو شیء در رسته اول را به بررسی یک‌ریختی تصویرهای آنها در رسته دوم تحویل می‌کند. با استفاده از این مفهوم، چندین تابعگون طبقه‌بندی کننده بین رسته‌های گروه‌های بعد، C^* -جبرها و سیستم‌های مینیمال کانتور می‌سازیم و در نتیجه بیانی رسته‌ای و تعمیمی از قضایای جیوردانو، پاتنم و اسکاو به دست می‌آوریم.

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

واژه‌های کلیدی:

تابعگون طبقه‌بندی کننده،
گروه بعد،
نمودار براتلی،
 C^* -جبر،
سیستم مینیمال کانتور،
هم‌ارزی مداری.

استناد: گلستانی، ناصر؛ (۱۴۰۲). ارتباط رسته‌ای بین گروه‌های بعد، C^* -جبرها و سیستم‌های مینیمال کانتور. پژوهش‌های ریاضی، ۹ (۱)، ۱۶۴-۱۸۸.



© نویسندگان.

ناشر: دانشگاه خوارزمی

مقدمه و تعاریف اولیه

استفاده از نظریهٔ رسته‌ها در شاخه‌های مختلف ریاضیات از آنجا که یک دیدگاه کلی نسبت به بسیاری از مفاهیم مشترک (مانند یکرختی و حاصل ضرب فضاها) ایجاد می‌کند و اینکه در برخی موارد، پلهایی بین شاخه مختلف برقرار می‌کند تا بتوان از ابزارهای یک شاخه برای شاخه دیگر استفاده کرد، بسیار اهمیت دارد. مفهوم تابعگون^۱ در واقع نقش این پله‌ها را بازی می‌کند. مطلوب‌ترین حالت وقتی است که یک تابعگون بین دو رسته، هم‌ارزی رسته‌ها^۲ باشد که در اینصورت دو رسته به اصطلاح یکی هستند، که البته به ندرت رخ می‌دهد. یک حالت دیگر این است که یک تابعگون، کلاس‌های یکرختی را حفظ کند. این مفهوم که بطور رسمی توسط جورج الیوت در سال ۲۰۱۰ با هدف طبقه‌بندی C^* -جبرهای جدایی‌پذیر مطرح شد [۹] به صورت زیر است:

تعریف ۱. یک تابعگون $F: C \rightarrow D$ یک تابعگون طبقه‌بندی‌کننده^۳ نامیده می‌شود هرگاه برای هر دو شیء a و b در رسته C ، اگر $F(a) \cong F(b)$ در رسته D آنگاه $a \cong b$ در رسته C . تابعگون F طبقه‌بندی‌کننده قوی نامیده می‌شود هرگاه برای هر یکرختی $g: F(a) \rightarrow F(b)$ در D یک یکرختی $f: a \rightarrow b$ در C موجود باشد که $F(f) = g$.

توجه کنید که عکس تعریف فوق (با بکارگیری تعریف تابعگون) همواره برقرار است، یعنی اگر $a \cong b$ آن‌گاه $F(a) \cong F(b)$. بنابراین اگر F یک تابعگون طبقه‌بندی‌کننده باشد آنگاه برای هر دو شیء a و b در رسته C داریم $a \cong b$ اگر و تنها اگر $F(a) \cong F(b)$. به بیان دیگر، یک تابعگون طبقه‌بندی‌کننده، بررسی یکرختی دو شیء در رسته دامنه را به بررسی یکرختی تصویر آنها در رسته برد تحویل می‌کند. این ویژگی، به خصوص وقتی که رسته دامنه یک رسته پیچیده و کمتر شناخته شده باشد و رسته برد یک رسته ملموس باشد، کاربرد بیشتری دارد. به عنوان مثال، قضیهٔ طبقه‌بندی الیوت بیان می‌کند که تابعگون K_0 از رسته AF جبرها به رسته گروه‌های بعد، یک تابعگون طبقه‌بندی‌کننده قوی است [۸، ۲]. همچنین یک تابعگون طبقه‌بندی‌کننده قوی $BD: AF \rightarrow BD$ از رسته AF جبرها به رسته نمودارهای براتلی وجود دارد [۲]. پیدا کردن تابعگون‌های طبقه‌بندی‌کننده بین رسته‌های مختلف در شاخه‌های مختلف ریاضیات می‌تواند بسیار مفید باشد زیرا علاوه بر این که به بررسی مسئله یکرختی کمک می‌کند، ریکتارهای^۴ رسته‌ها را نیز در نظر می‌گیرد، زیرا یک تابعگون علاوه بر اینکه روی اشیاء عمل می‌کند، روی ریکتارها نیز عمل می‌کند و می‌تواند برای حل مسائلی کاربرد داشته باشد. به عنوان مثال، در مرجع [۱۳] با بکارگیری تابعگون $P: SDS \rightarrow OBD$ که در [۳] ساخته شده است، یک مسئله باز در مورد فاکتورهای

¹ functor

² equivalence of categories

³ classification functor

⁴ morphism

سیستم‌های مینیمال کانتور با رتبه متناهی حل شده است که مدتها با استفاده از ابزارهای درونی شاخه دینامیک توپولوژیک حل نشده بود.

در این مقاله، چندین تابعگون طبقه‌بندی کننده^۵ (قوی) می‌سازیم. ابتدا تابعگون حد مستقیم $D: \mathbf{BD} \rightarrow \mathbf{DG}$ از رسته نمودارهای براتلی به رسته گروه‌های بعد را می‌سازیم و نشان می‌دهیم که یک هم‌ارزی رسته هاست و در نتیجه دو رسته \mathbf{BD} و \mathbf{DG} در واقع یکی هستند (هرچند در ظاهر متفاوت به نظر می‌رسند). اینکه این دو رسته هم‌ارز هستند، قبلاً نیز در [۲] به طور غیرمستقیم ثابت شده بود ولی ضابطه صریحی برای تابعگونی که این هم‌ارزی را برقرار می‌کند به دست نیامده بود. در این جا یک ضابطه برای این تابعگون به دست می‌آوریم که در مطالعه اشیاء و ریختارهای هر یک از این رسته‌ها به وسیله رسته دیگر مفید خواهد بود. سپس تابعگون $A: \mathbf{DS} \rightarrow \mathbf{AF}$ را از رسته سیستم‌های دینامیکی مینیمال کانتور به رسته \mathbf{AF} جبرها تعریف می‌کنیم و نشان می‌دهیم که یک تابعگون پادوردای^۵ پر است که وفادار و طبقه‌بندی کننده نمی‌باشد. این تابعگون در واقع یک مثال نقض در این حوزه فراهم می‌کند که نشان می‌دهد برخی خواص شناخته شده نظریه رسته‌ها، به تنهایی خاصیت طبقه‌بندی را نتیجه نمی‌دهند.

در بخش آخر این مقاله نیز، دو تابعگون $K_{\text{Inf}}^0: \mathbf{DS}^{\text{orb}} \rightarrow \mathbf{DG}_1$ و $K^0: \mathbf{DS}^{\text{sorb}} \rightarrow \mathbf{DG}_1$ را که به ترتیب مرتبط با هم‌ارزی مداری و هم‌ارزی مداری قوی سیستم‌های دینامیکی مینیمال کانتور هستند، می‌سازیم و ثابت می‌کنیم که هر دو طبقه‌بندی کننده می‌باشند. به این ترتیب بیانی رسته‌ای از قضایای مشخص‌سازی هم‌ارزی مداری و هم‌ارزی مداری قوی منسوب به جیوردانو، پاتنم و اسکاو (قضایای ۱۵ و ۲۱) به دست می‌آوریم و به یک معنا آنها را تعمیم می‌دهیم به طوری که علاوه بر حالت یکرختی، ریختارها نیز لحاظ شوند.

به عنوان پیش‌نیاز، تعریف رسته \mathbf{BD} را به اختصار یادآوری می‌کنیم [۲].

تعریف ۲. یک نمودار براتلی^۶ زوج مرتبی مانند $B = (V, E)$ است که $V = (V_n)_{n=1}^{\infty}$ و $E = (E_n)_{n=1}^{\infty}$ دنباله‌هایی از ماتریسها هستند که در شرایط زیر صدق می‌کنند:

$$1- \text{ هر } V_n \text{ یک ماتریس ستونی } k_n \times 1 \text{ با درایه‌های صحیح و مثبت است که } k_n \geq 1;$$

۲- هر E_n یک ماتریس نشاننده از V_n به V_{n+1} است، یعنی یک ماتریس $k_{n+1} \times k_n$ با درایه‌های صحیح و نامنفی است که ستونهای آن ناصفرند و $E_n V_n \leq V_{n+1}$ (با ترتیب مؤلفه‌ای).

⁵ contravariant functor

⁶ Bratteli diagram

نمودارهای براتلی را براتلی در سال ۱۹۷۲ برای مطالعه و طبقه‌بندی \mathcal{AF} جبرها معرفی کرد [5]. به عنوان مثال، برای \mathcal{AF} جبر M_{2^∞} که به صورت یک حد مستقیم M_{2^n} ها تعریف می‌شود، نمودار براتلی آن برابر است با $B = (V, E)$ که برای هر n ، $V_n = (2^n)$ و $E_n = (2)$ (ماتریس‌های 1×1).

یادآوری می‌کنیم که روش معادل دیگری برای تعریف نمودارهای براتلی بر حسب گراف‌های جهت‌دار نامتناهی وجود دارد [۱۴، ۳] که بیشتر در کاربردهای این نمودارها در مطالعه سیستم‌های دینامیکی مینیمال کانتور استفاده می‌شود. در این جا، تعریف فوق که به زبان ماتریس‌ها است با اهداف جبر عملگرها مناسب‌تر است.

مجموعه نمودارهای براتلی را با \mathbf{BD} نمایش می‌دهیم، که در واقع یک رسته است. در ادامه تعریف مفاهیم پیش‌ریختار^۷ و ریختار را از [۳] نقل می‌کنیم. یادآوری می‌کنیم که اگر V و W ماتریسهایی ستونی با درایه‌های صحیح و نامنفی باشند که به ترتیب n و m سطر دارند، منظور از یک ماتریس چندگانگی F از V به W یک ماتریس $m \times n$ است که $FV \leq W$.

تعریف ۳. فرض کنید $B = (V, E)$ و $C = (W, S)$ دو نمودار براتلی باشند. یک پیش‌ریختار $f: B \rightarrow C$ زوج مرتبی مانند $((F_n)_{n=1}^\infty, (f_n)_{n=1}^\infty)$ است که در آن دنباله‌ای از ماتریس‌هاست و $(f_n)_{n=1}^\infty$ دنباله‌ای بیکران از اعداد طبیعی است که $f_1 \leq f_2 \leq \dots$ و شرایط زیر برقرارند:

۱- هر F_n یک ماتریس چندگانگی از V_n به W_{f_n} است؛

۲- نمودار f که بصورت زیر می‌باشد جابه‌جایی است، یعنی برای هر عدد طبیعی $n \geq 1$ ، $F_{n+1}E_n = S_{f_n, f_{n+1}}F_n$ که در آن $S_{k,l} = S_{l-1}S_l \dots S_{k+1}S_k$ برای هر دو عدد طبیعی k, l که $k < l$

$$\begin{array}{ccccccc} V_1 & \xrightarrow{E_1} & V_2 & \xrightarrow{E_2} & V_3 & \xrightarrow{E_3} & \dots \\ F_1 \downarrow & & F_2 \downarrow & & F_3 \downarrow & & \\ W_{f_1} & \xrightarrow{S_{f_1, f_2}} & W_{f_2} & \xrightarrow{S_{f_2, f_3}} & W_{f_3} & \xrightarrow{S_{f_3, f_4}} & \dots \end{array}$$

اگر $f: B \rightarrow C$ و $g: C \rightarrow D$ پیش‌ریختار باشند که $f = ((F_n)_{n=1}^\infty, (f_n)_{n=1}^\infty)$ و $g = ((G_n)_{n=1}^\infty, (g_n)_{n=1}^\infty)$ آن‌گاه ترکیب آنها به صورت $gf = ((H_n)_{n=1}^\infty, (h_n)_{n=1}^\infty)$ تعریف می‌شود که $h_n = g_{f_n}$ و $H_n = G_{f_n}F_n$ برای هر $n \geq 1$. مجموعه \mathbf{BD} به همراه پیش‌ریختارها یک رسته است ولی با اهداف طبقه‌بندی، مناسب نمی‌باشد (زیرا تابع‌گون‌های خاصی به توی \mathbf{BD} خوش‌تعریف نمی‌شوند، مانند $[2] \mathcal{B}: \mathcal{AF} \rightarrow \mathbf{BD}$). مفهوم مناسب ریختار در رسته \mathbf{BD} با استفاده از یک رابطه هم‌ارزی که روی مجموعه پیش‌ریختارهای از یک نمودار براتلی B به C تعریف می‌شود به دست می‌آید [۳]. مجموعه کلاس‌های

⁷ premorphism

هم‌ارزی به شکل $[f]$ که $f: B \rightarrow C$ پیش‌ریختار است، ریختارهای از B به C را تشکیل می‌دهند. مجموعه \mathbf{BD} به همراه این ریختارها، رسته نمودارهای براتلی نامیده می‌شود.

معادل فارسی اکثر کلمات انگلیسی با استفاده از مرجع [۱] انتخاب شده‌اند مگر کلماتی که در این مرجع یافت نشدند.

تابعگون حد مستقیم

در این بخش تابعگون حد مستقیم $\mathbf{D}: \mathbf{BD} \rightarrow \mathbf{DG}$ را از رسته نمودارهای براتلی به رسته گروه‌های بعد (مقیاس‌دار) تعریف می‌کنیم. این که به هر نمودار براتلی B می‌توان یک گروه بعد مانند $\mathbf{D}(B)$ نظیر کرد، شناخته شده است [۸، ۱۴]. قسمت غیربدیهی در ساختن تابعگون \mathbf{D} ، تعریف آن روی ریختارهاست به طوری که خواص مورد نظر را دارا باشد. قضیه اصلی این بخش بیان می‌کند که \mathbf{D} در واقع یک هم‌ارزی رسته‌ها است، یعنی از دیدگاه نظریه رسته‌ها، رسته‌های \mathbf{BD} و \mathbf{DG} یکی هستند.

ابتدا به بیان تعاریف مورد نیاز در مورد گروه‌های بعد می‌پردازیم [۷]. این گروه‌ها را البوت در سال ۱۹۷۶ برای طبقه‌بندی \mathbf{AF} جبرها معرفی کرد [۸].

تعریف ۴. زوج مرتب (G, G^+) را یک گروه مرتب^۸ گوئیم هرگاه G یک گروه آبدی باشد و G^+ یک مخروط (مثبت) برای آن باشد، یعنی $G^+ + G^+ \subseteq G^+$ ، $G^+ - G^+ = G$ و $G^+ \cap (-G^+) = \{0\}$. در اینصورت G^+ یک رابطه ترتیب جزئی \leq روی G القا می‌کند که بصورت $x \leq y$ هرگاه $y - x \in G^+$ ، تعریف می‌شود. منظور از یک یکه ترتیبی^۹ برای (G, G^+) عنصری مانند $u \in G^+$ است که برای هر $g \in G^+$ عدد طبیعی n موجود است که $nu \geq g$. برای هر عدد طبیعی m ، مخروط استاندارد گروه جمعی \mathbb{Z}^m بصورت زیر است:

$$(\mathbb{Z}^m)^+ = \{(n_1, \dots, n_m) \mid n_i \geq 0, 1 \leq i \leq m\}.$$

همچنین عنصر $(1, 1, \dots, 1)$ یک یکه ترتیبی برای این گروه است. یک گروه بعد^{۱۰} یک گروه مرتب شماراست که یکرخت ترتیبی با حد مستقیم دنباله‌ای از گروه‌های آبدی آزاد متناهیاً تولید شده با مخروطهای استاندارد و همریختی‌های مثبت به عنوان نگاشتهای بین آنهاست [۸]، به عبارت دیگر، G یک گروه بعد است هرگاه یکرخت ترتیبی با گروهی به شکل $\lim_{n \rightarrow \infty} (G_n, \varphi_n)$ باشد که هر G_n به صورت مجموع مستقیم تعداد متناهی تا از گروه‌های مرتب \mathbb{Z}^m هاست و نگاشت

⁸ ordered group

⁹ order unit

¹⁰ dimension group

زیرمجموعه‌ای مانند Γ از G^+ است که مولد، موروثی و جهتدار باشد [۶]. در این صورت سه‌تایی (G, G^+, Γ) را یک گروه بعد مقیاس‌دار^{۱۲} می‌گوییم.

به عنوان مثال، برای هر عدد طبیعی m ، مجموعه اعداد صحیح از صفر تا m یک مقیاس برای گروه بعد $(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}^+)$ است. از نماد **DG** برای رسته گروه‌های بعد مقیاس‌دار به همراه هم‌ریختی‌های حافظ مقیاس استفاده می‌کنیم.

برای تعریف تابعگونی $\mathcal{D}: \mathbf{BD} \rightarrow \mathbf{DG}$ ابتدا در تعریف زیر به هر نمودار براتلی یک گروه بعد نظیر می‌کنیم.

تعریف ۵. فرض کنید $B = (V, E)$ یک نمودار براتلی باشد. گروه بعد مقیاس‌دار $\mathcal{D}(B) = (G, G^+, \Gamma)$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم. فرض کنید $V = (V_n)_{n=1}^\infty$ ، $E = (E_n)_{n=1}^\infty$ و $V_n^T = (m_{n,1} \ m_{n,2} \ \dots \ m_{n,k_n})$ شکل سطری ماتریس ستونی V_n باشد. قرار می‌دهیم $G_n = \mathbb{Z}^{k_n}$ و G_n^+ را مخروط استاندارد \mathbb{Z}^{k_n} می‌گیریم. قرار می‌دهیم

$$\Gamma_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_{k_n}) \in G_n \mid 0 \leq a_i \leq m_{n,i}, 1 \leq i \leq k_n\}.$$

سه‌تایی (G_n, G_n^+, Γ_n) یک گروه بعد مقیاس‌دار است. هم‌ریختی $\varphi_n: G_n \rightarrow G_{n+1}$ را نگاشت ضرب در E_n تعریف می‌کنیم، یعنی $\varphi_n(x) = E_n x$ که در آن هر عضو x از G_n را به صورت یک ماتریس ستونی در نظر می‌کنیم. نگاشت‌های φ_n را نگاشت‌های ارتباطی^{۱۳} می‌نامیم. توجه کنید که برای هر عدد طبیعی n ، $\varphi_n(\Gamma_n) \subseteq \Gamma_{n+1}$ زیرا $E_n V_n \leq V_{n+1}$. حال قرار می‌دهیم $\mathcal{D}(B) = \lim_{n \rightarrow \infty} (G_n, \varphi_n)$

حد مستقیم فوق را با جزییات توصیف می‌کنیم زیرا در ادامه به آن نیاز داریم. ابتدا قرار می‌دهیم

$$G_\infty = \{(a_n) \in \prod_{n=1}^\infty G_n \mid \exists m \geq 1, a_{n+1} = \varphi_n(a_n) \ (n \geq m)\}.$$

سپس G_0 را زیرگروه G_∞ متشکل از دنباله‌هایی که از جایی به بعد صفر هستند می‌گیریم و قرار می‌دهیم $G = G_\infty / G_0$. فرض کنید $\pi: G_\infty \rightarrow G$ نگاشت خارج قسمتی باشد. قرار می‌دهیم

$$G^+ = \pi(G_\infty \cap \prod_{n=1}^\infty G_n^+), \quad \Gamma = \pi(G_\infty \cap \prod_{n=1}^\infty \Gamma_n).$$

در این صورت $\mathcal{D}(B) = (G, G^+, \Gamma)$

¹¹ scale

¹² scaled dimension group

¹³ connecting maps

برای تکمیل تعریف تابعگونی $D: \mathbf{BD} \rightarrow \mathbf{DG}$ ، آن را روی ریختارهای رسته \mathbf{BD} نیز تعریف می‌کنیم. فرض کنید B, C نمودارهای براتلی باشند و $h: B \rightarrow C$ یک ریختار در رسته \mathbf{BD} باشد. ریختار $D(h): D(B) \rightarrow D(C)$ در رسته \mathbf{DG} را به صورت زیر تعریف می‌کنیم. فرض کنید $f: B \rightarrow C$ یک پیش‌ریختار باشد که $h = [f]$. فرض کنید $B = (V, E)$ و $C = (W, S)$ و $f = ((f_n)_{n=1}^\infty, (f_n)_{n=1}^\infty)$. گروه‌های بعد مقیاس‌دار $D(B) = (G, G^+, \Gamma)$ و $D(C) = (H, H^+, \Lambda)$ به همراه نگاشت‌های ارتباطی $(\varphi_n)_{n=1}^\infty$ و $(\psi_n)_{n=1}^\infty$ را مانند تعریف قبل در نظر می‌گیریم. فرض کنید $\eta_n: G_n \rightarrow H_{f_n}$ نگاشت ضرب در F_n باشد. چون نمودار f جابجایی است، برای هر $n \geq 1$

$$\eta_{n+1} \circ \varphi_n = \psi_{f_n, f_{n+1}} \circ \eta_n,$$

که در آن هر دو عدد طبیعی n, k که $n < k$ منظور از $\psi_{n,k}$ همریختی $\psi_n \psi_{k-1} \psi_{k-2} \cdots \psi_{n+1}$ از H_n به H_k است و $\psi_{n,n} = \text{id}_{H_n}$. پس نمودار جابه‌جایی زیر را داریم:

$$\begin{array}{ccccccc} G_1 & \xrightarrow{\varphi_1} & G_2 & \xrightarrow{\varphi_2} & G_3 & \xrightarrow{\varphi_3} & \cdots \\ \eta_1 \downarrow & & \eta_2 \downarrow & & \eta_3 \downarrow & & \\ H_{f_1} & \xrightarrow{\psi_{f_1, f_2}} & H_{f_2} & \xrightarrow{\psi_{f_2, f_3}} & H_{f_3} & \xrightarrow{\psi_{f_3, f_4}} & \cdots \end{array}$$

همریختی‌های $\eta_n: G_n \rightarrow H_{f_n}$ یک همریختی طبیعی $\eta: G \rightarrow H$ القا می‌کند که $\eta(G^+) \subseteq H^+$ و $\eta(\Gamma) \subseteq \Lambda$. به‌طور دقیق‌تر، برای هر $(a_n)_{n=1}^\infty$ در G_∞ ، عنصر $(b_n)_{n=1}^\infty + H_0 = \eta((a_n)_{n=1}^\infty + G_0)$ در H_∞/H_0 را به‌صورت زیر تعریف می‌کنیم. فرض کنید عدد طبیعی m چنان باشد که برای هر $n \geq m$ ، $a_{n+1} = \varphi_n(a_n)$. برای هر $n \geq m$ و هر $f_n < k < f_{n+1}$ قرار می‌دهیم

$$b_1 = b_2 = \cdots = b_{f_m-1} = 0, \quad b_{f_n} = \eta_n(a_n), \quad b_k = \varphi_{f_n, k}(b_{f_n}).$$

در این صورت η خواص مورد نظر را دارد و وابسته به نماینده f از کلاس h نیز نیست (با استفاده از گزاره ۱۱، ۲ مرجع [۲]). قرار می‌دهیم $D(h) = \eta$ که یک ریختار از $D(B)$ به $D(C)$ است.

بررسی این‌که $D: \mathbf{BD} \rightarrow \mathbf{DG}$ یک تابعگونی است سراسر است می‌باشد. برای درک بهتر تعریف این تابعگونی روی اشیاء و ریختارها، یک مثال می‌آوریم.

مثال ۶. نمودارهای B و C و پیش‌ریختار $f: B \rightarrow C$ را به صورت زیر در نظر بگیرید. فرض کنید $B = (V, E)$ و $C = (W, S)$ برای هر $n \geq 1$ قرار می‌دهیم

$$V_n = (2^{n-1}), \quad E_n = (2), \quad W_n = (6^{n-1}), \quad S_n = (6).$$

پیش‌ریختار $f = ((F_n)_{n=1}^\infty, (n)_{n=1}^\infty)$ نیز به صورت $F_n = (3^{n-1})$ تعریف می‌شود. در این صورت به راحتی می‌توان دید

$$\mathcal{D}(B) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mathbb{Z}, \varphi_n) \text{ که } \varphi_n(x) = 2x \text{ و } \mathcal{D}(C) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mathbb{Z}, \psi_n) \text{ که } \psi_n(x) = 6x \text{ پس}$$

$$\mathcal{D}(B) \cong \mathbb{Z}[\frac{1}{2}] = \{\frac{k}{2^n} \mid k \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\}, \quad \mathcal{D}(C) \cong \mathbb{Z}[\frac{1}{6}] = \{\frac{k}{6^n} \mid k \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\}$$

به عنوان زیرگروه‌هایی از $(\mathbb{Q}, +)$ و علاوه بر $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}]^+ = \mathbb{Q}^+ \cap \mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ و $\mathbb{Z}[\frac{1}{6}]^+ = \mathbb{Q}^+ \cap \mathbb{Z}[\frac{1}{6}]$ مقیاس‌های $\mathcal{D}(B)$ و $\mathcal{D}(C)$ نیز به ترتیب برابرند با $[\cdot, 1] \cap \mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ و $[\cdot, 1] \cap \mathbb{Z}[\frac{1}{6}]$. در واقع با در نظر گرفتن هم‌ریختی‌های $\theta_n: G_n = \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ و $\delta_n: H_n = \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ که $\delta_n(x) = \frac{x}{2^{n-1}}$ و $\theta_n(x) = \frac{x}{6^{n-1}}$ و استفاده از خاصیت جهانی حد مستقیم، نشاننده‌های $\theta: \lim_{n \rightarrow \infty} (G_n, \varphi_n) \rightarrow \mathbb{Q}$ و $\delta: \lim_{n \rightarrow \infty} (H_n, \psi_n) \rightarrow \mathbb{Q}$ با بردهای به ترتیب $G = \mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ و $H = \mathbb{Z}[\frac{1}{6}]$ به دست می‌آیند و خواص فوق‌براحتی بررسی می‌شوند. برای به دست آوردن هم‌ریختی $\mathcal{D}([f]): \mathcal{D}(B) \rightarrow \mathcal{D}(C)$ نیز با توجه به این‌که نمودار زیر، برای هر $n \geq 1$ جابه‌جایی است:

$$\begin{array}{ccc} G_n = \mathbb{Z} & \xrightarrow{\theta_n} & G = \mathbb{Z}[\frac{1}{2}] \\ \eta_n \downarrow & & \downarrow j \\ H_n = \mathbb{Z} & \xrightarrow{\delta_n} & H = \mathbb{Z}[\frac{1}{6}]. \end{array}$$

بنابراین $\mathcal{D}([f]) = j$ نیز نگاشت شمول از $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ به $\mathbb{Z}[\frac{1}{6}]$ است.

قضیه زیر بیان می‌کند که رسته‌های \mathbf{BD} و \mathbf{DG} از دیدگاه نظریه رسته‌ها یکی هستند. قبل از بیان این قضیه، مفاهیمی را از نظریه رسته‌ها یادآوری می‌کنیم [۱۲، ۱۶]. دو رسته \mathbf{C} و \mathbf{D} هم‌ارز نامیده می‌شوند هرگاه یک تابعگونی $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ وجود داشته باشد که هم‌ارزی رسته‌هاست، یعنی یک تابعگونی دیگر $G: \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ وجود داشته باشد که $GF \cong \text{id}_{\mathbf{C}}$ و $FG \cong \text{id}_{\mathbf{D}}$ که نماد \cong در این‌جا به معنی یک‌ریختی طبیعی^{۱۴} است. قضیه ۱، ۴، ۴ مرجع [۱۶] بیان می‌کند که یک تابعگونی $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ یک هم‌ارزی رسته‌هاست اگر و تنها اگر یک تابعگونی پُر، وفادار و اساساً پوشا باشد. یادآوری می‌کنیم که تابعگونی $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$

¹⁴ natural isomorphism

پرا^{۱۵} نامیده می‌شود هرگاه برای هر دو شیء a, b در \mathbf{C} و هر ریختار $h: F(a) \rightarrow F(b)$ یک ریختار $f: a \rightarrow b$ در \mathbf{C} موجود باشد که $h = F(f)$. تابعگون وفادار^{۱۶} نامیده می‌شود هرگاه برای هر دو شیء a, b و هر دو ریختار $f, g: a \rightarrow b$ در \mathbf{C} ، اگر $f = g$ آنگاه $F(f) = F(g)$. همچنین تابعگون اساساً پوشا^{۱۷} نامیده می‌شود هرگاه برای هر شیء d در \mathbf{D} یک شیء a در \mathbf{C} موجود باشد که $d \cong F(a)$.

قضیه^{۱۷}. تابعگون $\mathbf{D}: \mathbf{BD} \rightarrow \mathbf{DG}$ یک هم‌ارزی رسته‌ها است.

برهان. روند اثبات به این صورت است که نشان می‌دهیم \mathbf{D} پر، وفادار و اساساً پوشاست. ابتدا نشان می‌دهیم \mathbf{D} وفادار است. فرض کنید B, C دو نمودار براتلی باشند و $h, k: B \rightarrow C$ دو ریختار باشند که $D(h) = D(k)$. فرض کنید $f = ((F_n)_{n=1}^\infty, (f_n)_{n=1}^\infty)$ و $g = ((K_n)_{n=1}^\infty, (g_n)_{n=1}^\infty)$ پیش‌ریختارهایی از B به C باشند که $h = [f]$ و $h' = [g]$. نشان می‌دهیم f و g هم‌ارزند (و در نتیجه $h = h'$). برای اثبات این هم‌ارزی، تعریف ۹،۲ مرجع [۲] را بررسی می‌کنیم.

فرض کنید $B = (V, E)$ و $C = (W, S)$. گروه‌های بعد مقیاس‌دار $D(B) = (G, G^+, \Gamma)$ و $D(C) = (H, H^+, \Lambda)$ همراه نگاشت‌های ارتباطی $(\varphi_n)_{n=1}^\infty$ و $(\psi_n)_{n=1}^\infty$ را مانند تعریف ۵ در نظر می‌گیریم. عدد طبیعی n را ثابت در نظر می‌گیریم و m را طوری می‌گیریم که $G_n = \mathbb{Z}^m$. بعلاوه $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ را پایه استاندارد G_n (به عنوان \mathbb{Z} -مدول) در نظر می‌گیریم. حال x_1, x_2, \dots, x_m در G_∞ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم. می‌نویسیم $x_i = (x_{i,k})_{k=1}^\infty$ که در آن

$$x_{i,1} = x_{i,2} = \dots = x_{i,(n-1)} = 0, \quad x_{i,n} = e_i, \quad x_{i,k} = \varphi_{n,k}(e_i) \quad (k > n).$$

توجه کنید که منظور از $\varphi_{n,k}$ در رابطه بالا، هم‌ریختی $\varphi_{n,k} = \varphi_{k-1}\varphi_{k-2}\dots\varphi_n$ از G_n به G_k است. فرض کنید $\eta_n: G_n \rightarrow H_{f_n}$ و $\theta_n: G_n \rightarrow H_{g_n}$ نگاشت‌های به دست آمده از به کارگیری تعریف ۵ برای f و g باشند. از آنجا که برای هر $1 \leq i \leq m$ ، $D(h)(x_i + G_0) = D(k)(x_i + G_0)$ ، نتیجه می‌گیریم که عدد طبیعی $l \geq f_n, g_n$ موجود است به طوری که $\psi_{f_n,l} \circ \eta_n(e_i) = \psi_{g_n,l} \circ \theta_n(e_i)$. پس $\psi_{f_n,l} \circ \eta_n = \psi_{g_n,l} \circ \theta_n$ و در نتیجه $S_{f_n,l}F_n = S_{g_n,l}K_n$. حال با استفاده از گزاره ۱۱،۲ مرجع [۲] نتیجه می‌گیریم که f و g هم‌ارزند. بنابراین \mathbf{D} وفادار است.

حال نشان می‌دهیم \mathbf{D} یک تابعگون پر است. فرض کنید $\varphi: D(B) \rightarrow D(C)$ ریختاری در رسته \mathbf{DG} باشد. باید یک ریختار $h: B \rightarrow C$ در رسته \mathbf{BD} پیدا کنیم که $D(h) = \varphi$. نمادگذاری بند قبل را در این جا نیز استفاده می‌کنیم. فرض کنید برای هر n ، $\varphi^n: G_n \rightarrow G$ و $\psi^n: H_n \rightarrow H$ هم‌ریختی‌های کانونیک باشند که در ساختن حد مستقیم در تعریف ۵ به

¹⁵ full

¹⁶ faithful

¹⁷ essentially surjective

دست می‌آیند. بنابراین $\Gamma = \bigcup_{n=1}^{\infty} \varphi^n(\Gamma_n)$ و $\Lambda = \bigcup_{n=1}^{\infty} \psi^n(\Lambda_n)$ چون هر G_n یک گروه با تولید متناهی است، یک دنباله صعودی اکید $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ از اعداد طبیعی وجود دارد که برای هر n ، $\varphi(\varphi^n(\Gamma_n)) \subseteq \psi^{f_n}(\Lambda_{f_n})$. پس همریختی (نه لزوماً یکتای) $\theta_n: G_n \rightarrow H_{f_n}$ وجود دارد که حافظ مقیاس و ترتیب است و $\varphi\varphi^n = \psi^{f_n}\theta_n$ نمودار (نه لزوماً جابجایی) زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{array}{ccccc} G_n & \xrightarrow{\varphi_n} & G_{n+1} & \xrightarrow{\varphi^{n+1}} & G \\ \theta_n \downarrow & & \downarrow \theta_{n+1} & & \downarrow \varphi \\ H_{f_n} & \xrightarrow{\psi_{f_n, f_{n+1}}} & H_{f_{n+1}} & \xrightarrow{\psi^{f_{n+1}}} & H \end{array}$$

مربع سمت راست جابجایی است. همچنین اگر θ_{n+1} را حذف کنیم، مستطیل باقیمانده نیز جابجایی است. بنابراین $\psi^{f_{n+1}}\theta_{n+1}\varphi_n = \psi^{f_{n+1}}\psi_{f_n, f_{n+1}}\theta_n$ از آنجا که G_n یک گروه با تولید متناهی است، عدد $m_n \geq f_{n+1}$ موجود است که

$$\psi_{f_{n+1}, m_n}\theta_{n+1}\varphi_n = \psi_{f_{n+1}, m_n}\psi_{f_n, f_{n+1}}\theta_n = \psi_{f_n, m_n}\theta_n$$

به عنوان نگاشت‌هایی از G_n به H_{f_n} این نشان می‌دهد که می‌توان دنباله $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ را با دنباله دیگری (که با همان $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ نمایش می‌دهیم) جایگزین کرد بطوریکه مربع سمت چپ در نمودار بالا، برای هر n جابجایی باشد. پس دنباله صعودی اکید $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ از اعداد طبیعی و همریختی‌های حافظ ترتیب و مقیاس $\eta_n: G_n \rightarrow H_{f_n}$ ، $n \geq 1$ را بدست می‌آوریم به طوری که $\eta_{n+1}\varphi_n = \psi_{f_n, f_{n+1}}\eta_n$ و $\varphi\varphi^n = \psi^{f_n}\eta_n$ برای هر $n \geq 1$ ، ماتریس یکتای F_n با درایه‌های صحیح و نامنفی وجود دارد که ضابطه η_n همان نگاشت ضرب در F_n است. قرار می‌دهیم $f = ((F_n)_{n=1}^{\infty}, (f_n)_{n=1}^{\infty})$. در این صورت براحتی می‌توان دید که f یک پیش‌ریختار است و $\mathcal{D}([f]) = \varphi$. بنابراین \mathcal{D} یک تابعگن پر است.

تنها چیزی که باقیمانده است، بررسی اساساً پوشا بودن \mathcal{D} است. بنا بر قضیه افراس-هندلمن-شن (قضیه ۲،۲ مرجع [۷])، هر گروه بعد مقیاس دار G را می‌توان یکرخت ترتیبی با حد مستقیمی از گروه‌های آبدی آزاد متناهیاً تولید شده در نظر گرفت و هر یک از گروه‌های اخیر را نیز می‌توان با استفاده از یک نمودار براتلی مناسب B ، یکرخت با $\mathcal{D}(B)$ در نظر گرفت. بنابراین $\mathcal{D}(B) \cong G$. بنابراین تابعگن \mathcal{D} اساساً پوشاست. حال بنابر مطالب بیان شده در بند قبل از این قضیه، \mathcal{D} یک هم‌ارزی رسته‌هاست. ■

نتیجه ۸. تابعگون $D: \mathbf{BD} \rightarrow \mathbf{DG}$ یک تابعگون طبقه‌بندی کننده قوی است.

برهان. بنا بر قضیه ۶ (یا برهان آن)، D یک تابعگون پر و وفادار می‌باشد. از طرفی، هر تابعگون پر و وفادار یک تابعگون طبقه‌بندی کننده قوی است (بنابر لم ۱۰، ۵ مرجع [۲]). بنابراین حکم نتیجه می‌شود. ■

تابعگون $A: \mathbf{DS} \rightarrow \mathbf{AF}$

در این بخش تابعگون $A: \mathbf{DS} \rightarrow \mathbf{AF}$ از رسته سیستم‌های دینامیکی مینیمال کانتور به رسته \mathbf{AF} جبرها را تعریف می‌کنیم و نشان می‌دهیم که یک تابعگون پادوردای پر است که وفادار و طبقه‌بندی کننده نمی‌باشد. این قضیه دارای دو نتیجه است. اول این‌که، صرفاً پر بودن یک تابعگون، خواص دیگر رسته‌ای آن را (مانند وفادار و طبقه‌بندی کننده بودن) نتیجه نمی‌دهد. دوم این‌که، مفهوم یکرختی در رسته \mathbf{DS} که در واقع همان تزویج^{۱۸} است، یک مفهوم خیلی قوی است که منجر به وفادار نبودن و طبقه‌بندی کننده نبودن تابعگون A شده است. مفاهیم ضعیف‌تر از تزویج (مانند هم‌ارزی مدار) را در بخش بعد بررسی خواهیم کرد.

تعریف ۹. رسته \mathbf{DS} متشکل از سه تایی‌های (X, φ, x) است که (X, φ) یک سیستم مینیمال کانتور است (یعنی X یک فضای متریک همسانریخت با مجموعه کانتور و $\varphi: X \rightarrow X$ یک همسانریختی است) و x نیز عنصری از X است. یک ریختار در رسته \mathbf{DS} از یک شیء (X, φ, x) به (Y, ψ, y) یک نگاشت پیوسته $\alpha: X \rightarrow Y$ است که $\alpha\varphi = \psi\alpha$ و $\alpha(x) = y$. در مرجع [۱۴] مفهوم تزویج توپولوژیکی نقطه‌وار^{۱۹} تعریف شده است که معادل یکرختی دو شیء در رسته \mathbf{DS} است. یکی از دلایل اهمیت این سیستم‌ها این است که می‌توان به هریک از آنها یک نمودار براتلی مرتب نظیر کرد [۱۴] و خواص دینامیکی را روی این نمودار مشاهده و بررسی کرد.

به هر سیستم دینامیکی مینیمال کانتور (X, φ) می‌توان یک C^* -جبر حاصلضرب صلیبی $\mathbb{Z} \rtimes_{\varphi} C(X)$ نظیر کرد (مراجع [۱۷، ۱۹] را ببینید). در واقع، همسانریختی $\varphi: X \rightarrow X$ ، خودریختی $C(X) \rightarrow C(X)$ را که f را به $f \circ \varphi^{-1}$ تصویر می‌کند، القا می‌کند و در نتیجه گروه \mathbb{Z} روی $C(X)$ عمل می‌کند و حاصلضرب صلیبی بدست می‌آید. اگر (Y, ψ) یک سیستم دینامیکی مینیمال کانتور دیگر باشد، هر نگاشت پیوسته $\alpha: X \rightarrow Y$ که $\alpha\varphi = \psi\alpha$ نیز بطور طبیعی یک $*$ -همریختی یکدار از $C(Y) \rtimes_{\psi} \mathbb{Z}$ به $C(X) \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}$ القا می‌کند که تحدید آن به $C(Y)$ با ضابطه $g \mapsto g \circ \alpha$ عمل می‌کند. بنابراین

¹⁸ conjugacy

¹⁹ pointed topological conjugacy

²⁰ crossed product C^* -algebra

نگاشتی که هر (X, φ) را به $C(X) \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}$ می‌برد یک تابعگن پادوردا از رسته سیستم‌های مینیمال کانتور به رسته C^* -جبرها می‌باشد. (این تابعگن را در حالت کلی‌تر که سیستم‌ها لزوماً مینیمال کانتور هم نیستند می‌توان تعریف کرد ولی در این جا به آن نیازی نداریم).

در ادامه، تابعگن A را تعریف می‌کنیم.

تعریف ۱۰. فرض کنید (X, φ, x) یک شیء در رسته \mathbf{DS} باشد. در اینصورت C^* -زیرجبر تولید شده توسط زیرمجموعه‌های $C(X)$ و $C_0(X \setminus \{x\})$ از حاصلضرب صلیبی $C(X) \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}$ را (که u عنصر یکانی متناظر با همسانریختی φ در حاصلضرب صلیبی است و $C_0(X \setminus \{x\})$ نیز توابعی در $C(X)$ هستند که در x صفر می‌شوند) با $A(X, \varphi, x)$ نشان می‌دهیم. بنا بر قضیه ۳،۳ مرجع [18]، $A(X, \varphi, x)$ یک \mathbf{AF} جبر است. برای هر ریختار $\alpha: (X, \varphi, x) \rightarrow (Y, \psi, y)$ در \mathbf{DS} نیز $A(\alpha)$ را تحدید $*$ -همریختی القا شده توسط α (از $C(Y) \rtimes_{\psi} \mathbb{Z}$ به $C(X) \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}$) به $A(Y, \psi, y)$ می‌گیریم. رسته \mathbf{AF} جبرها به همراه $*$ -همریختی‌ها را با \mathbf{AF} نشان می‌دهیم.

قضیه ۱۱. تابعگن $A: \mathbf{DS} \rightarrow \mathbf{AF}$ یک تابعگن پادوردای وفادار است که نه پر و نه طبقه‌بندی کننده می‌باشد.

برهان. ابتدا خوش تعریفی تابعگن A را بررسی می‌کنیم، یعنی اگر $\mathcal{X}_1 = (X, \varphi, x)$ و $\mathcal{X}_2 = (Y, \psi, y)$ عناصری از \mathbf{DS} باشند و $\alpha: \mathcal{X}_1 \rightarrow \mathcal{X}_2$ یک ریختار باشد آن گاه $*$ -همریختی القا شده توسط α ، زیرجبر $A(\mathcal{X}_2)$ را به $A(\mathcal{X}_1)$ می‌برد (و در نتیجه می‌توان آن را تحدید کرد). در واقع، چون $C(Y)$ به توی $C(X)$ تصویر می‌شود و u_2 (عنصر یکانی متناظر با ψ در $C(Y) \rtimes_{\psi} \mathbb{Z}$) نیز به u_1 تصویر می‌شود، کفایت بررسی کنیم که $C_0(Y \setminus \{y\})$ نیز به توی $C_0(X \setminus \{x\})$ تصویر می‌شود. برای هر $f \in C_0(Y \setminus \{y\})$ داریم

$$A(\alpha)(f)(x) = (f \circ \alpha)(x) = f(\alpha(x)) = f(y) = 0.$$

پس تصویر f در $C_0(X \setminus \{x\})$ است و در نتیجه $A: \mathbf{DS} \rightarrow \mathbf{AF}$ خوش تعریف است.

حال نشان می‌دهیم A وفادار است. فرض کنید $\alpha, \beta: \mathcal{X}_1 \rightarrow \mathcal{X}_2$ ریختارهایی در \mathbf{DS} باشند که $A(\alpha) = A(\beta)$. پس تحدیدهای $*$ -همریختی‌های یکدار $A(\alpha)$ و $A(\beta)$ از $C(Y)$ به $C(X)$ برابرند. حال با استفاده از این نکته که این همریختی‌ها، دو تابع پیوسته از فضای کاراکترهای $C(X)$ (که با X همسانریخت است) به فضای کاراکترهای $C(Y)$ (که با Y همسانریخت است) القا می‌کنند که همان α و β هستند (قضیه ۱،۲ مرجع [۴] و توضیحات قبل از آن را ببینید). در نتیجه $\alpha = \beta$ و A وفادار است.

برای این‌که نشان دهیم A یک تابعگون طبقه‌بندی نیست، فرض کنید (X, φ) و (Y, ψ) دو سیستم مینیمال کانتور باشند که هم‌ارز مداری قوی هستند (برای تعریف، مطالب قبل از قضیه ۲۱ را ببینید) ولی مزدوج نیستند. بنا بر [۱۰] چنین سیستم‌هایی وجود دارند. عناصر $x \in X$ و $y \in Y$ را به دلخواه انتخاب می‌کنیم. بنا بر قضیه ۲۱، AF جبرهای $A(X, \varphi, x)$ و $A(Y, \psi, y)$ یکریخت هستند. پس این دو AF جبر در رسته AF یکریختند ولی سیستم‌های (X, φ, x) و (Y, ψ, y) در رسته DS یکریخت نیستند، زیرا یکریختی در این رسته، مزدوج بودن سیستم‌های (X, φ) و (Y, ψ) را نتیجه می‌دهد. بنابراین A طبقه‌بندی کننده نیست.

بنا بر لم ۱۰، ۵ [۲]، هر تابعگون وفادار و پر، یک تابعگون طبقه‌بندی کننده قوی است. از آن‌جا که A وفادار است ولی طبقه‌بندی کننده نیست، نتیجه می‌گیریم که A پر نمی‌باشد. ■

هم‌ارزی مداری

در این بخش یک بیان رسته‌ای از قضایای مشخص‌سازی هم‌ارزی مداری و هم‌ارزی مداری قوی منسوب به جیوردانو، پاتنم و اسکو (قضایای ۱۵ و ۲۱) به دست می‌آوریم و آنها را تعمیم می‌دهیم به طوری که علاوه بر حالت یکریختی، ریختارها نیز لحاظ شوند (قضیه‌های ۲۰ و ۲۴).

ابتدا گروه‌های بعدی که به سیستم‌های مینیمال کانتور نظیر می‌شوند یادآوری می‌کنیم. برای هر سیستم مینیمال کانتور (X, φ) گروه جمعی توابع پیوسته از X به \mathbb{Z} را با $C(X, \mathbb{Z})$ نمایش می‌دهیم که یک گروه مرتب است با مخروط

$$C(X, \mathbb{Z})^+ = \{f \in C(X, \mathbb{Z}) \mid f \geq 0\}.$$

تابع ثابت ۱ را با نماد ۱ نشان می‌دهیم که در واقع یک یکه ترتیبی برای $C(X, \mathbb{Z})$ است. همسانریختی φ یک خودریختی φ_* روی $C(X, \mathbb{Z})$ القا می‌کند که هر تابع f را به $f \circ \varphi^{-1}$ می‌برد. نگاشت $\text{id} - \varphi_*$ نیز یک همریختی روی $C(X, \mathbb{Z})$ است. برد این همریختی را با B_φ نمایش می‌دهیم که دوگان-مرز^{۲۱} φ نامیده می‌شود. بنابراین

$$B_\varphi = \{f - f \circ \varphi^{-1} \mid f \in C(X, \mathbb{Z})\}.$$

گروه خارج قسمتی زیر را در نظر بگیرید

$$K^0(X, \varphi) = \frac{C(X, \mathbb{Z})}{B_\varphi}.$$

²¹ coboundary

اگر $K^0(X, \varphi)^+$ را تصویر $C(X, \mathbb{Z})^+$ تحت نگاشت خارج قسمتی $C(X, \mathbb{Z}) \rightarrow K^0(X, \varphi)$ بگیریم، آن‌گاه زوج مرتب $(K^0(X, \varphi), K^0(X, \varphi)^+)$ یک گروه بعد است و تصویر تابع ثابت ۱ تحت نگاشت خارج قسمتی (که با همان ۱ نمایش داده می‌شود) یک یکه ترتیبی برای آن است [۱۴].

نمادگذاری. از نماد \mathbf{DG}_1 برای رسته سه تایی‌های (G, G^+, u) استفاده می‌کنیم که (G, G^+) یک گروه بعد است و u یک یکه ترتیبی برای آن می‌باشد. ریختارهای این رسته، هم‌ریختی‌های گروهی هستند که مخروط و یکه ترتیبی را حفظ می‌کنند.

تعریف ۱۲. یک گروه بعد (G, G^+) را ساده گوئیم هرگاه هیچ ایده‌آل غیربدیهی نداشته باشد که در این‌جا منظور از یک ایده‌آل J از G زیرگروهی از G است بطوریکه $J = J^+ - J^+$ (که در آن $J^+ = J \cap G^+$) و برای هر $a \in G$ و هر $b \in J$ ، اگر $0 \leq a \leq b$ آن‌گاه $a \in J$. اگر G یک گروه ساده باشد و u یک یکه ترتیبی باشد، عنصر $a \in G$ را بینهایت کوچک^{۲۲} گوئیم هرگاه برای هر عدد گویای مثبت ε ، داشته باشیم $-\varepsilon u \leq a \leq \varepsilon u$ که در این‌جا اگر $\varepsilon = p/q$ آن‌گاه منظور از نامساوی $a \leq \varepsilon u$ رابطه $qa \leq pu$ است. مجموعه همه عناصر بینهایت کوچک را با $\text{Inf}(G)$ نشان می‌دهیم که زیرگروهی از G است و مستقل از انتخاب عنصر یکه ترتیبی u می‌باشد [۶].

مثال ۱۳. اگر (X, φ) یک سیستم مینیمال کانتور باشد آنگاه $(K^0(X, \varphi), K^0(X, \varphi)^+)$ یک گروه بعد ساده و نامتناهی است که دوری نمی‌باشد و به علاوه هر گروه بعد ساده غیر دوری نیز با یک $(K^0(X, \varphi), K^0(X, \varphi)^+)$ یکرخت است (مراجع [۱۰، ۱۴، ۱۸] را ببینید). همچنین بنابر قضیه^{۱۳، ۱} مرجع [۱۰]، زیرگروه بینهایت کوچک $K^0(X, \varphi)$ برابر است با

$$\text{Inf}(K^0(X, \varphi)) = Z_\varphi / B_\varphi \text{ که در آن}$$

$$Z_\varphi = \{f \in C(X, \mathbb{Z}) \mid \forall \mu \in P_\varphi(X) \int_X f d\mu = 0\}.$$

تعریف ۱۴. سیستم‌های مینیمال کانتور (X, φ) و (Y, ψ) را هم‌مداری^{۲۳} گویند هرگاه یک همسانریختی $\alpha: X \rightarrow Y$ وجود داشته باشد که مدارها را حفظ کند، یعنی $\alpha(\text{orbit}_\varphi(x)) = \text{orbit}_\psi \alpha(x)$ برای هر $x \in X$ ، که در آن مدار x تحت φ برابر است با

$$\text{orbit}_\varphi(x) = \{\varphi^n(x) \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

توجه کنید که تزویج، هم‌ارزی مداری را نتیجه می‌دهد.

قضیه مهم زیر، ترکیب قضیه^{۲، ۲} مرجع [۱۰] و قضیه^{۲، ۴} مرجع [۱۵] است.

²² infinitesimal

²³ orbit equivalent

قضیه ۱۵. فرض کنید (X, φ) و (Y, ψ) دو سیستم مینیمال کانتور باشند. گزاره‌های زیر معادلند:

۱- سیستم‌های (X, φ) و (Y, ψ) هم‌ارز مداری هستند؛

۲- گروه‌های بعد $K^0(X, \varphi)/\text{Inf}(K^0(X, \varphi))$ و $K^0(Y, \psi)/\text{Inf}(K^0(Y, \psi))$ یکرخت ترتیبی‌اند با نگاهی که یکه ترتیبی را حفظ می‌کند؛

۳- یک همسانریختی $\alpha: X \rightarrow Y$ وجود دارد که اندازه‌های بورل احتمال φ -پایا را به اندازه‌های بورل احتمال ψ -پایا می‌برد؛

۴- C^* -جبرهای $C(X) \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}$ و $C(Y) \rtimes_{\psi} \mathbb{Z}$ هم‌ارز اثری^{۲۴} هستند.

برای به دست آوردن یک بیان رسته‌ای از قضیه فوق، ابتدا تعریف زیر را ارائه می‌دهیم. برای هر سیستم مینیمال کانتور (X, φ) ، مجموعه $P_{\varphi}(X)$ متشکل از همه اندازه‌های بورل احتمال φ -پایا μ روی X است، یعنی $\mu(\varphi(E)) = \mu(E)$ برای هر زیرمجموعه بورل E از X .

تعریف ۱۶. رسته \mathbf{DS}^{orb} را بصورت زیر تعریف می‌کنیم. اشیاء این رسته، سیستم‌های مینیمال کانتور هستند. یک ریختار $(Y, \psi) \rightarrow (X, \varphi)$ در رسته \mathbf{DS}^{orb} ، یک نگاشت پیوسته $\alpha: X \rightarrow Y$ است که $P_{\varphi}(X)\alpha^{-1} \subseteq P_{\psi}(Y)$ ، یعنی α اندازه‌های بورل احتمال φ -پایا را به اندازه‌های بورل احتمال ψ -پایا می‌برد. ترکیب دو ریختار نیز به صورت ترکیب توابع تعریف می‌شود. تابعگون پادوردای $\mathbf{DG}_1: \mathbf{DS}^{\text{orb}} \rightarrow \mathbf{DG}_1$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم. برای هر سیستم مینیمال کانتور (X, φ) قرار می‌دهیم

$$K_{\text{Inf}}^0(X, \varphi) = K^0(X, \varphi)/\text{Inf}(K^0(X, \varphi))$$

که یک گروه بعد ساده است. با استفاده از مثال ۱۳، این گروه با $C(X, \mathbb{Z})/Z_{\varphi}$ بطور طبیعی یکرخت است و بنابراین بعضی جاها آنها را یکی در نظر می‌گیریم. گروه بعد $K_{\text{Inf}}^0(X, \varphi)$ به همراه مخروط آن و یکه ترتیبی ۱ که به ترتیب تصویر $C(X, \mathbb{Z})^+$ و تابع ثابت ۱ تحت نگاشت خارج قسمتی $C(X, \mathbb{Z}) \rightarrow C(X, \mathbb{Z})/Z_{\varphi}$ هستند، یک شیء در رسته \mathbf{DG}_1 است. اثر K_{Inf}^0 روی ریختارها نیز به طور طبیعی تعریف می‌شود، یعنی اگر $\alpha: (X, \varphi) \rightarrow (Y, \psi)$ یک ریختار در \mathbf{DS}^{orb} باشد آن‌گاه $K_{\text{Inf}}^0(\alpha): K_{\text{Inf}}^0(Y, \psi) \rightarrow K_{\text{Inf}}^0(X, \varphi)$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم

$$K_{\text{Inf}}^0(\alpha)(f + Z_{\psi}) = f \circ \alpha + Z_{\varphi}, f \in C(Y, \mathbb{Z}).$$

²⁴ tracially equivalent

تعریف فوق خوش تعریف است زیرا اگر $f \in Z_\psi$ آن‌گاه برای هر $\mu \in P_\varphi(X)$ ، چون $\mu\alpha^{-1} \in P_\psi(Y)$ داریم

$$\int_X f \circ \alpha d\mu = \int_Y f d(\mu\alpha^{-1}) = 0.$$

پس $f \circ \alpha \in Z_\varphi$. بنابراین $\mathbf{DS}^{\text{orb}} \rightarrow \mathbf{DG}_1$ یک تابعگن پادوردا است.

توجه کنید که بنابر قضیه ۱۵، دو سیستم مینیمال کانتور (X, φ) و (Y, ψ) در رسته \mathbf{DS}^{orb} یک‌ریختند اگر و تنها اگر هم‌ارز مداری باشند.

در ادامه به تعریف زیر که از [۱۱] نقل می‌شود نیاز داریم.

تعریف ۱۷. فرض کنید (X, φ) یک سیستم مینیمال کانتور باشد. گروه پر^{۲۵} این سیستم که با $\text{FG}(X, \varphi)$ نشان داده می‌شود، مجموعه همه همسانریختی‌های $T: X \rightarrow X$ است که یک تابع $n: X \rightarrow \mathbb{Z}$ با خاصیت $T(x) = \varphi^{n(x)}(x)$ ، $x \in X$ موجود است. از مینیمال بودن (X, φ) نتیجه می‌شود که تابع $n: X \rightarrow \mathbb{Z}$ با این خاصیت منحصر بفرد است. این تابع را تابع تغییر زمان^{۲۶} می‌نامند.

گزاره ۱۸. فرض کنید (X, φ) و (Y, ψ) دو سیستم مینیمال کانتور باشند و $\alpha: X \rightarrow Y$ نگاشتی پیوسته باشد. گزاره‌های زیر را در نظر بگیرید:

۱- نگاشت α اندازه‌های بول احتمال φ -پایا را به اندازه‌های بول احتمال ψ -پایا می‌برد؛

۲- برای هر $x \in X$ ، $\alpha(\text{orbit}_\varphi(x)) \supseteq \text{orbit}_\psi \alpha(x)$ ؛

۳- عنصر $T \in \text{FG}(X, \varphi)$ موجود است که $\psi \circ \alpha = \alpha \circ T$ ؛

در این صورت گزاره (۳)، گزاره‌های (۱) و (۲) را نتیجه می‌دهد.

برهان. فرض کنید (۳) برقرار باشد. ابتدا (۲) را ثابت می‌کنیم. برای هر $k \in \mathbb{Z}$ داریم $\alpha \circ T^k = \psi^k \circ \alpha$. فرض کنید $x \in X$ هر عنصر $\text{orbit}_\psi \alpha(x)$ به شکل $\psi^k(\alpha(x))$ ، برای یک $k \in \mathbb{Z}$ است. چون $\psi^k(\alpha(x)) = \alpha(T^k(x))$ و $T^k(x) \in \text{orbit}_\varphi(x)$ پس $\psi^k(\alpha(x)) \in \alpha(\text{orbit}_\varphi(x))$.

²⁵ full group

²⁶ time change

حال (۱) را ثابت می‌کنیم. فرض کنید $n: X \rightarrow \mathbb{Z}$ تابع تغییر زمان برای T باشد. برای هر $k \in \mathbb{Z}$ قرار می‌دهیم

$$A_k = \{x \in X \mid n(x) = k\}.$$

در این صورت A_k یک زیرمجموعه بسته از X است (چون T^k پیوسته است) و $X = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} A_k = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \varphi^k(A_k)$ که این اجتماع‌ها مجزا هستند، یعنی A_k ها دو به دو مجزایند و $\varphi^k(A_k)$ ها نیز دو به دو مجزایند. حال فرض کنید $\nu \in P_\varphi(X)$ اندازه بورل μ روی Y را بصورت $\mu = \nu \alpha^{-1}$ تعریف می‌کنیم. نشان می‌دهیم $\mu \in P_\psi(Y)$. فرض کنید E یک زیرمجموعه بورل از Y باشد. برای هر $k \in \mathbb{Z}$ داریم $k \in \mathbb{Z}$ داریم $\alpha^{-1}(\psi^{-1}(E)) \cap A_k = \varphi^{-k}(\alpha^{-1}(E)) \cap A_k$. بنابراین

$$\begin{aligned} \mu(\psi^{-1}(E)) &= \nu(\alpha^{-1}(\psi^{-1}(E))) \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \nu(\alpha^{-1}(\psi^{-1}(E)) \cap A_k) \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \nu(\varphi^{-k}(\alpha^{-1}(E)) \cap A_k) \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \nu(\alpha^{-1}(E) \cap \varphi^k(A_k)) \\ &= \nu(\psi^{-1}(E)) = \mu(E). \end{aligned}$$

پس μ یک اندازه احتمال ψ -پایاست و در نتیجه (۱) برقرار است. ■

توجه کنید که شرط (۲) در گزاره فوق نتیجه می‌دهد که α پوشاست (با استفاده از این نکته که مینیمال بودن معادل چگال بودن مدارهاست). ممکن است هر سه شرط در گزاره فوق معادل باشند ولی در اینجا تنها می‌توانیم نتیجه شدن (۱) از (۲) را با فرض یک به یک بودن α روی مدارها ثابت کنیم. لم زیر را ببینید.

لم ۱۹. فرض کنید (X, φ) و (Y, ψ) دو سیستم مینیمال کانتور باشند و $\alpha: X \rightarrow Y$ نگاشتی پیوسته باشد به طوری که برای هر $x \in X$ $\alpha(\text{orbit}_\varphi(x)) \supseteq \text{orbit}_\psi \alpha(x)$ برای $k \in \mathbb{Z}$ هر قرار می‌دهیم

$$A_k = \{x \in X \mid \psi \circ \alpha(x) = \alpha \circ \varphi^k(x)\},$$

$$B_k = \{x \in X \mid \psi^{-1} \circ \alpha(x) = \alpha \circ \varphi^k(x)\}.$$

فرض کنید A_k ها دوبدو مجزا باشند و B_k ها نیز دو به دو مجزا باشند. در اینصورت $P_\psi(Y) \alpha^{-1} \subseteq P_\varphi(X)$. به خصوص اگر $\alpha: X \rightarrow Y$ نگاشتی پیوسته باشد که روی هر مدار یک به یک است (یعنی برای هر $x \in X$ و هر $k, m \in \mathbb{Z}$ اگر $\alpha(\varphi^k(x)) = \alpha(\varphi^m(x)) = \alpha(\varphi^m(x))$ آن‌گاه در گزاره قبل، شرط (۲) شرط (۱) را نتیجه می‌دهد.

برهان. ابتدا می‌توان به راحتی بررسی کرد که $B_k = \varphi^{-k}(A_{-k})$, $k \in \mathbb{Z}$. از طرف دیگر، چون برای هر $X = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} A_k = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \varphi^k(A_k)$ پس $X = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} A_k = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} B_k$ بنابراین $\alpha(\text{orbit}_\varphi(x)) \supseteq \text{orbit}_\psi \alpha(x)$ $x \in X$ که این اجتماع‌ها مجزا هستند. حال با استدلالی مشابه استدلال ارائه شده در برهان گزاره قبل، نتیجه می‌گیریم $P_\varphi(X)\alpha^{-1} \subseteq P_\psi(Y)$ برای قسمت دوم این لم، توجه کنید که یک به یک بودن α روی هر مدار نتیجه می‌دهد که A_k ها دو به دو مجزاند و B_k ها نیز دو به دو مجزا هستند. بنابراین، قسمت دوم از قسمت اول نتیجه می‌شود. ■

قضیه ۲۰. تابعگون $K_{\text{Inf}}^0: \mathbf{DS}^{\text{orb}} \rightarrow \mathbf{DG}_1$ یک تابعگون طبقه‌بندی کننده و پر است. به علاوه، این تابعگون وفادار نمی‌باشد.

برهان. طبقه‌بندی کننده بودن K_{Inf}^0 از معادل بودن موارد (۱) و (۲) در قضیه ۱۵ و این نکته که دو سیستم مینیمال کانتور در رسته \mathbf{DS}^{orb} یکرخت هستند اگر و تنها اگر هم‌ارز مداری باشند، نتیجه می‌شود. حال نشان می‌دهیم K_{Inf}^0 پر است. فرض کنید (X, φ) و (Y, ψ) دو سیستم مینیمال کانتور باشند و $h: K_{\text{Inf}}^0(Y, \psi) \rightarrow K_{\text{Inf}}^0(X, \varphi)$ ریختاری در رسته \mathbf{DG}_1 باشد. بنابر گزاره ۹،۲ مرجع [۱۱]، یک تابع پیوسته $\alpha: X \rightarrow Y$ و یک عنصر $T \in \text{FG}(X, \varphi)$ وجود دارند که $\alpha \circ T = \psi \circ \alpha$ و اینکه α همریختی h را روی گروه‌های بعد خارج قسمتی القا می‌کند، یعنی $K_{\text{Inf}}^0(\alpha) = h$. با استفاده از گزاره ۱۸، $\alpha(\text{orbit}_\varphi(x)) \supseteq \text{orbit}_\psi \alpha(x)$ در نتیجه طبق تعریف ۱۷، α ریختاری در رسته \mathbf{DS}^{orb} است. بنابراین K_{Inf}^0 یک تابعگون پر است.

حال نشان می‌دهیم تابعگون K_{Inf}^0 وفادار نیست. فرض کنید $\beta: (X, \varphi) \rightarrow (Y, \psi)$ یک ریختار در \mathbf{DS}^{orb} باشد. برای هر $T \in \text{FG}(X, \varphi)$ و هر $S \in \text{FG}(Y, \psi)$ ادعا می‌کنیم

$$K_{\text{Inf}}^0(S \circ \beta \circ T) = K_{\text{Inf}}^0(\beta).$$

برای اثبات این ادعا قرار می‌دهیم $\alpha = S \circ \beta \circ T$. طبق تعریف ۱۷، برای اثبات تساوی فوق باید نشان دهیم برای هر $f \in C(Y, \mathbb{Z})$ داریم $f \circ \alpha - f \circ \beta \in Z_\varphi$. فرض کنید $\mu \in P_\varphi(X)$. چون μ اندازه‌ای φ -پایا است، T -پایا نیز می‌باشد زیرا می‌توان گزاره ۱۸ را به ازای $\psi = T$ و $\alpha = \text{id}_X$ بکار برد و نتیجه گرفت که μ اندازه‌ای T -پایاست (توجه کنید که مینیمال بودن ψ در اثبات گزاره ۱۸ نیازی نیست). همچنین چون β ریختاری در رسته \mathbf{DS}^{orb} است، پس $\mu\beta^{-1}$ اندازه‌ای ψ -پایاست و در نتیجه S -پایا نیز می‌باشد. با استفاده از این مطالب داریم:

$$\begin{aligned} \int_X f \circ \alpha \, d\mu &= \int_X f \circ S \circ \beta \circ T \, d\mu \\ &= \int_X f \circ S \circ \beta \, d\mu = \int_Y f \circ S \, d(\mu\beta^{-1}) \\ &= \int_Y f \, d(\mu\beta^{-1}) = \int_X f \circ \beta \, d\mu. \end{aligned}$$

پس $f \circ \alpha - f \circ \beta \in Z_\varphi$. در نتیجه ادعای فوق برقرار است. این ادعا نشان می‌دهد که K_{Inf}^0 وفادار نیست زیرا به فرض خلف، فرض کنید K_{Inf}^0 وفادار باشد. همچنین فرض کنید (X, φ) یک سیستم مینیمال کانتور دلخواه باشد. قرار می‌دهیم $Y = X$ ، $\psi = \varphi$ ، $\beta = \text{id}_X$ و $S = T = \varphi$. حال با استفاده از ادعای فوق و فرض وفاداری K_{Inf}^0 داریم $S \circ \beta \circ T = \beta$ یعنی $\varphi^2 = \text{id}_X$ که با مینیمال بودن سیستم (X, φ) در تناقض است (زیرا در این صورت مدار هر $x \in X$ برابر است با $\{x, \varphi(x)\}$ که در X چگال نیست). پس K_{Inf}^0 وفادار نیست. ■

در ادامه این بخش، تابعگون $\mathbf{DG}_1 \rightarrow \mathbf{DS}^{\text{orb}}: K^0$ را می‌سازیم و یک بیان رسته‌ای و تعمیمی از قضیه بعد به دست می‌آوریم. ابتدا مفهوم هم‌ارزی مداری قوی را یادآوری می‌کنیم (تعریف ۳، ۱ مرجع [۱۰]). دو سیستم مینیمال کانتور (X, φ) و (Y, ψ) را هم‌ارز مداری قوی^{۲۷} گویند هرگاه یک همسانریختی $\alpha: X \rightarrow Y$ موجود باشد که مدارها را حفظ کند (یعنی برای هر $x \in X$ ، $\alpha(\text{orbit}_\varphi(x)) = \text{orbit}_\psi(\alpha(x))$) و هر کدام از توابع دوگان-دور $m, n: X \rightarrow \mathbb{Z}$ که با استفاده از روابط $\alpha \circ \varphi(x) = \psi^{n(x)} \circ \alpha(x)$ و $\alpha \circ \varphi^{m(x)}(x) = \psi \circ \alpha(x)$ ، $x \in X$ ، تعریف می‌شوند حداکثر یک نقطه ناپیوستگی داشته باشند. (توجه کنید که اگر m یا n پیوسته باشد آنگاه این دو سیستم مزدوج خواهند شد [۱۰]).

قضیه مهم زیر را از [۱۴] و [۱۰] نقل می‌کنیم.

قضیه ۲۱. فرض کنید (X, φ) و (Y, ψ) دو سیستم مینیمال کانتور باشند. گزاره‌های زیر معادلند:

- ۱- سیستم‌های (X, φ) و (Y, ψ) هم‌ارز مداری قوی هستند؛
- ۲- گروه‌های مرتب $K^0(X, \varphi)$ و $K^0(Y, \psi)$ یکرخت ترتیبی‌اند با نگاهی که یکه ترتیبی را حفظ می‌کند؛
- ۳- C^* -جبرهای $C(X) \rtimes_\varphi \mathbb{Z}$ و $C(Y) \rtimes_\psi \mathbb{Z}$ یکرخت هستند؛
- ۴- AF جبرهای $A(X, \varphi, x)$ و $A(Y, \psi, x)$ یکرخت هستند، به ازای یک $x \in X$ و $y \in Y$.

برای به دست آوردن تعریف مناسبی از ریختار بین سیستم‌های مینیمال کانتور بطوریکه یکرختی حاصل از آن، معادل هم‌ارزی مداری قوی باشد، به لم زیر نیاز داریم.

لم ۲۲. فرض کنید (X, φ) و (Y, ψ) دو سیستم مینیمال کانتور باشند و $\alpha: X \rightarrow Y$ نگاشتی پیوسته باشد که در مفروضات لم ۱۹ صدق می‌کند. تابع دوگان-دور $m: X \rightarrow \mathbb{Z}$ را با رابطه $\alpha \circ \varphi^{m(x)}(x) = \psi^{-1} \circ \alpha(x)$ ، $x \in X$ ، تعریف می‌کنیم.

²⁷ strong orbit equivalent

²⁸ cocycle maps

فرض کنید m حداکثر یک نقطه ناپیوستگی داشته باشد. در این صورت $B_\psi \circ \alpha \subseteq B_\varphi$ ، یعنی برای هر $g \in B_\psi$ داریم $g \circ \alpha \in B_\varphi$.

برهان. از آن جا که $C(Y, \mathbb{Z})$ با ترکیب خطی (با ضرایب صحیح) توابع مشخصه χ_E که $E \subseteq Y$ هم باز و هم بسته است، برابر می‌باشد، برای اثبات حکم کافیست نشان دهیم $(\chi_E - \chi_E \circ \psi^{-1}) \circ \alpha \in B_\varphi$ ، برای هر زیرمجموعه باز و بسته E از Y . ابتدا توجه کنید که

$$(\chi_E - \chi_E \circ \psi^{-1}) \circ \alpha = \chi_{\alpha^{-1}(E)} - \chi_{\alpha^{-1}(\psi(E))}.$$

فرض کنید تابع دوگان-دور $m: X \rightarrow \mathbb{Z}$ در همه نقاط بجز احتمالاً در $x_0 \in X$ پیوسته باشد. برای هر $k \in \mathbb{Z}$ قرار می‌دهیم

$$B_k = \{x \in X \mid \psi^{-1} \circ \alpha(x) = \alpha \circ \varphi^k(x)\}.$$

بنابر قسمت اول برهان لم ۱۹ داریم $X = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \varphi^k(B_k)$ (اجتماع مجزا). فرض کنید E یک زیرمجموعه باز و بسته از Y باشد. دو حالت داریم.

حالت اول: $x_0 \notin \alpha^{-1}(\psi(E))$ در اینصورت

$$\begin{aligned} K &:= \{k \in \mathbb{Z} \mid \alpha^{-1}(E) \cap \varphi^k(B_k) \neq \emptyset\} \\ &= \{k \in \mathbb{Z} \mid \varphi^{-k}(\alpha^{-1}(E)) \cap B_k \neq \emptyset\} \\ &= \{k \in \mathbb{Z} \mid \alpha^{-1}(\psi(E)) \cap B_k \neq \emptyset\}. \end{aligned}$$

چون تابع m روی مجموعه فشرده $\alpha^{-1}(\psi(E))$ پیوسته است، K یک مجموعه متناهی است. بعلاوه چون $\alpha^{-1}(\psi(E))$ باز است، مجموعه $\alpha^{-1}(\psi(E)) \cap B_k$ نیز برای هر $k \in \mathbb{Z}$ باز است. از طرف دیگر هر B_k نیز بسته می‌باشد. بنابراین برای هر $k \in \mathbb{Z}$ ، مجموعه $\alpha^{-1}(E) \cap \varphi^k(B_k)$ باز و بسته است. داریم

$$\begin{aligned} \chi_{\alpha^{-1}(E)} - \chi_{\alpha^{-1}(\psi(E))} &= \chi_{\alpha^{-1}(E)} - \sum_{k \in K} \chi_{\alpha^{-1}(\psi(E)) \cap B_k} \\ &= \chi_{\alpha^{-1}(E)} - \sum_{k \in K} \chi_{\varphi^{-k}(\alpha^{-1}(E) \cap \varphi^k(B_k))} \\ &= \sum_{k \in K} \chi_{\alpha^{-1}(E) \cap \varphi^k(B_k)} - \sum_{k \in K} \chi_{\varphi^{-k}(\alpha^{-1}(E) \cap \varphi^k(B_k))} \\ &= \sum_{k \in K} (\chi_{\alpha^{-1}(E) \cap \varphi^k(B_k)} - \chi_{\varphi^{-k}(\alpha^{-1}(E) \cap \varphi^k(B_k))}). \end{aligned}$$

توجه کنید که برای هر زیرمجموعه باز و بسته A از X و هر $k \in \mathbb{Z}$ ، تابع $\chi_A - \chi_{\varphi^{-k}(A)}$ در B_φ است. حال تساوی‌های بالا

$$\chi_{\alpha^{-1}(E)} - \chi_{\alpha^{-1}(\psi(E))} \in B_\varphi$$

حالت دوم: $x_0 \in \alpha^{-1}(\psi(E))$ در این صورت به ازای $F = X \setminus E$ داریم $x_0 \notin \alpha^{-1}(\psi(F))$. بنابراین از حالت اول نتیجه می‌گیریم که $\mathcal{X}_{\alpha^{-1}(F)} - \mathcal{X}_{\alpha^{-1}(\psi(F))} \in B_\varphi$. از طرف دیگر، داریم

$$\mathcal{X}_{\alpha^{-1}(E)} - \mathcal{X}_{\alpha^{-1}(\psi(E))} = -(\mathcal{X}_{\alpha^{-1}(F)} - \mathcal{X}_{\alpha^{-1}(\psi(F))}).$$

بنابراین $\mathcal{X}_{\alpha^{-1}(E)} - \mathcal{X}_{\alpha^{-1}(\psi(E))} \in B_\varphi$ و اثبات کامل است. ■

تعریف ۲۳. رسته $\mathbf{DS}^{\text{sorb}}$ را بصورت زیر تعریف می‌کنیم. اشیاء این رسته سیستم‌های دینامیکی مینیمال کانتور هستند. یک ریختار $\alpha: (X, \varphi) \rightarrow (Y, \psi)$ در این رسته یک تابع پیوسته $\alpha: X \rightarrow Y$ است که $B_\psi \circ \alpha \subseteq B_\varphi$ ، یعنی برای هر $g \circ \alpha \in B_\varphi$ ، $g \in B_\psi$. تابعگون $K^0: \mathbf{DS}^{\text{sorb}} \rightarrow \mathbf{DG}_1$ را بصورت زیر تعریف می‌کنیم. برای هر سیستم مینیمال کانتور (X, φ) ، همانند ابتدای این بخش قرار می‌دهیم $K^0(X, \varphi) = C(X, \mathbb{Z})/B_\varphi$. بنابر مطالب ابتدای این بخش، $(K^0(X, \varphi), K^0(X, \varphi)^+, 1)$ عضوی از رسته \mathbf{DG}_1 است. اگر $\alpha: (X, \varphi) \rightarrow (Y, \psi)$ ریختاری در رسته $\mathbf{DS}^{\text{sorb}}$ باشد، همریختی $K^0(\alpha): K^0(Y, \psi) \rightarrow K^0(X, \varphi)$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم

$$K^0(\alpha)(g + B_\psi) = g \circ \alpha + B_\varphi, \quad g \in C(Y, \mathbb{Z}).$$

توجه کنید که چون $B_\psi \circ \alpha \subseteq B_\varphi$ ، همریختی فوق خوش تعریف است، یعنی وابسته به نماینده g نیست.

قضیه ۲۴. تابعگوی پادوردای $K^0: \mathbf{DS}^{\text{sorb}} \rightarrow \mathbf{DG}_1$ یک تابعگون طبقه‌بندی کننده است.

برهان. فرض کنید (X, φ) و (Y, ψ) دو سیستم مینیمال کانتور باشند که $K^0(X, \varphi) \cong K^0(Y, \psi)$ در رسته \mathbf{DG}_1 باید نشان دهیم یک یکرختی $\alpha: (X, \varphi) \rightarrow (Y, \psi)$ در رسته $\mathbf{DS}^{\text{sorb}}$ وجود دارد، یعنی یک همسانریختی $\alpha: X \rightarrow Y$ که $B_\psi \circ \alpha = B_\varphi$. ابتدا بنا بر قضیه ۲۱، سیستم‌های (X, φ) و (Y, ψ) هم‌ارز مداری قوی هستند. پس یک همسانریختی $\alpha: X \rightarrow Y$ وجود دارد که مدارها را حفظ می‌کند و هر کدام از توابع دوگان-دور آن (یعنی $m, n: X \rightarrow \mathbb{Z}$) حداکثر یک نقطه ناپیوستگی دارد. از آن‌جا که برای هر $x \in X$ داریم $\psi \circ \alpha(x) = \alpha \circ \varphi^{m(x)}(x)$ ، از لم ۲۲ نتیجه می‌گیریم $B_{\psi^{-1}} \circ \alpha \subseteq B_\varphi$. چون $B_{\psi^{-1}} = B_\psi$ ، پس $B_\psi \circ \alpha \subseteq B_\varphi$. به علاوه، برای هر $x \in X$ ، $\alpha \circ \varphi(x) = \psi^{n(x)} \circ \alpha(x)$ ، بنابراین برای هر $y \in Y$ داریم

$$\varphi \circ \alpha^{-1}(y) = \alpha^{-1} \circ \psi^{n(\alpha^{-1}(y))}(y).$$

توجه کنید که تابع $m \circ \alpha^{-1}: Y \rightarrow \mathbb{Z}$ نیز حداکثر یک نقطه ناپیوستگی دارد. با استفاده مجدد از لم ۲۲ نتیجه می‌گیریم

■ $B_{\varphi^{-1}} \circ \alpha^{-1} \subseteq B_\psi$. بنابراین $B_\varphi \circ \alpha^{-1} \subseteq B_\psi$ (زیرا $B_{\varphi^{-1}} = B_\varphi$). پس $B_\psi \circ \alpha = B_\varphi$ و اثبات کامل است.

خواص دیگر تابعگون $K^0: \mathbf{DS}^{\text{sorb}} \rightarrow \mathbf{DG}_1$ مانند پر یا وفادار بودن، ناشناخته هستند.

References

۱. انجمن ریاضی ایران با همکاری گروه ریاضی و آمار مرکز نشر دانشگاهی، *واژه نامه ریاضی و آمار*، مرکز نشر دانشگاهی، (۱۳۸۵).
2. M. Amini, G. A. Elliott, and N. Golestani, “The category of Bratteli diagrams”, *Canad. J. Math.*, 67 (2015), 990-1023.
3. M. Amini, G. A. Elliott, and N. Golestani, “The category of ordered Bratteli diagrams”, *Canad. J. Math.*, 73 (2021), 1-28.
4. M. Amini and N. Golestani, “Discretization of topological spaces”, *Quart. J. Math.*, 67 (2016), 781-799.
5. O. Bratteli, “Inductive limits of finite dimensional C^* -algebras”, *Trans. Amer. Math. Soc.*, 171 (1972), 195-234.
6. E. G. Effros, “Dimensions and C^* -Algebras”, *CBMS Regional Conference Series in Mathematics*, 46, Conference Board of the Mathematical Sciences, Washington, D.C., 1981.
7. E. G. Effros, D.E. Handelman, and C.-L. Shen, “Dimension groups and their affine representations”, *Amer. J. Math.*, 102 (1980), 385–402.
8. G. A. Elliott, “On the classification of inductive limits of sequences of semisimple finite dimensional algebras”, *J. Algebra*, 38 (1976), 29–44.
9. G. A. Elliott, “Towards a theory of classification”, *Adv. Math.*, 223 (2010), 30–48.
10. R. Giordano, I.F. Putnam, and C.F. Skau, “Topological orbit equivalence and C^* -crossed products”, *J. Reine Angew. Math.*, 469 (1995), 51–111.
11. E. Glasner and B. Weiss, “Weak orbit equivalence of Cantor minimal systems”, *Internat. J. Math.*, 6 (1995), 559–579.
12. R. Goldblatt, “*Topoi, the Categorical Analysis of Logic*”, Elsevier Science Publishers, New York, 1984.

13. N. Golestani and M. Hosseini, “On topological rank of factors of Cantor minimal systems”, *Ergodic Theory Dynam. Systems*, accepted.
14. R. H. Herman, I.F. Putnam, and C.F. Skau, “Ordered Bratteli diagrams, dimension groups and topological dynamics”, *Internat. J. Math.*, 3 (1992), 827–864.
15. H. Lin, “Tracial equivalence for C^* -algebras and orbit equivalence for minimal dynamical systems”, *Proc. Edinb. Math. Soc. (Series 2)*, 48 (2005), 673–690.
16. S. Mac Lane, “Categories for the Working Mathematician”, Second Edition, Springer, New York, 1998.
17. G. K. Pedersen, “ C^* -Algebras and Their Automorphism Groups”, London Mathematical Society Monographs, Vol. 14, Academic Press, London, 1979.
18. I. F. Putnam, “ C^* -algebras associated with minimal homeomorphisms of the Cantor set”, *Pacific J. Math.*, 136 (1989), 329–353.
19. D. P. Williams, “Crossed Products of C^* -Algebras”, *Mathematical Surveys and Monographs*, Volume: 134, American Mathematical Society, 2007.